

1. feladat (16 pont)

Állapítsa meg az alábbi hatványsor konvergenciatartományát!

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \cdot 3^n} (x+3)^n$$

Mo. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} \stackrel{(1p)}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{|(-1)^n|}{n \cdot 3^n}} \stackrel{(2p)}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n} \cdot 3} \stackrel{(1p)}{=} \frac{1}{3} \stackrel{(1p)}{=} \frac{1}{R} \implies R = 3,$
tehát $|x+3| < 3$ esetén a sor konvergens **(3p)**

$$x = 0 : \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \cdot 3^n} \cdot 3^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \text{ konvergens (nem abszolút konvergens) (3p)}$$

$$x = -6 : \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \cdot 3^n} \cdot (-3)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} (-1)^{2n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ divergens (3p)}$$

KT (konvergenciatartomány): $(-6, 0]$ **(2p)**

2. feladat (13 pont)

Közelítse az

$$\int_0^1 \cos(2x^3) dx$$

integrált a függvény hatodfokú, 0-körüli Taylor-polinomjának integráljával! Adjon becslést a hibára!

Mo. A \cos függvény Taylor-sora alapján **(1p)** .

$$f(x) = \cos(2x^3) \stackrel{(5p)}{=} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^{2n}}{(2n)!} x^{6n}.$$

$R = \infty$ (az adott intervallumon alkalmazható a sorfejtés). Tehát:

$$\int_0^1 f(x) dx \stackrel{(1p)}{=} \left(\int_0^1 1 - \frac{4}{2!} \cdot x^6 + \frac{16}{4!} x^{12} \pm \dots dx \right) =$$

$$\stackrel{(2p)}{=} \left(1 - \frac{4}{14} + \frac{16}{24 \cdot 13} \pm \dots \right).$$

Itt az első két tag adja a hatodfokú Taylor-polinom integrálját, a következő tag pedig a hibát (Leibniz-sor). Így az integrál közelítése $10/14 = 0.71$, a hiba pedig nem nagyobb, mint $16/(24 \cdot 13) = 0.05$. **(4p)**

3. feladat (24 pont)

Hol folytonos az alábbi függvény? Számolja ki a parciális deriváltjait! Hol lehetnek a függvénynek lokális szélsőérték helyei, vagyis melyek a függvény stacionárius pontjai?

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{5x^2y^2}{2x^2 + 7y^2}, & \text{ha } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & \text{ha } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Mo. Ha $(x, y) \neq (0, 0)$ akkor a függvény folytonos, mert folytonos függvények összetétele **(2p)**.

Vizsgálandó a $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ határérték! Az $x_n = r_n \cos \varphi_n$, $y_n = r_n \sin \varphi_n$ sorozatok mentén **(2p)**:

$$\lim_{r_n \rightarrow 0} f(r_n \cos \varphi_n, r_n \sin \varphi_n) = \lim_{r_n \rightarrow 0} r_n^2 \underbrace{\frac{5 \cos^2 \varphi_n \sin^2 \varphi_n}{2 + 5 \sin^2 \varphi_n}}_{|\cdot| < \frac{5}{2}} = 0 \quad \text{(4p)}$$

így a függvény az origóban is folytonos. Ha $(x, y) \neq (0, 0)$, akkor az

$$f'_x(x, y) \stackrel{\text{(3p)}}{=} \frac{10xy^2(2x^2 + 7y^2) - 5x^2y^2 \cdot 4x}{(2x^2 + 7y^2)^2} \stackrel{\text{(1p)}}{=} \frac{70xy^4}{(2x^2 + 7y^2)^2}$$

$$f'_y(x, y) \stackrel{\text{(3p)}}{=} \frac{10x^2y(2x^2 + 7y^2) - 5x^2y^2 \cdot 14y}{(2x^2 + 7y^2)^2} \stackrel{\text{(1p)}}{=} \frac{20x^4y}{(2x^2 + 7y^2)^2}.$$

$(x, y) = (0, 0)$ esetén $f'_x(0, 0) = 0 = f'_y(0, 0)$ **(4p)**. A parciális deriváltak értéke csak a tengelyeken 0, tehát csak ott lehetnek lokális szélsőérték helyek. **(4p)**

4. feladat (8+14=22 pont)

a) Mikor mondjuk, hogy egy $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ függvény az (x_0, y_0) pontban totálisan differenciálható? Adjon elégséges feltételt a totális differenciálhatóságra.

b) Határozza meg az

$$f(x, y) = \sin((3x - y)^3) - 8y$$

függvény $(1, 3)$ pontbeli érintősíkjának egyenletét! Számolja ki az f függvény $(4, -3)$ vektorral párhuzamos iránymenti deriváltját a $(1, 3)$ pontban.

Mo. a) Definíció **(4p)**. Ha a függvény és parciális deriváltjai folytonosak az (x_0, y_0) pontban, akkor a függvény az (x_0, y_0) pontban totálisan differenciálható. **(4p)**

b) $f(1, 3) = -24$, **(1p)** $f'_x = 9(3x - y)^2 \cos(3x - y)^3$, **(2p)** $f'_y = -3(3x - y)^2 \cos(3x - y)^3 - 8$ **(2p)** tehát a grad $f(1, 3) = (0, -8)$ **(2p)**, így az érintősík egyenlete: $z =$

$-8y$. (2p)

Az adott irányvektor irányába mutató egységvektor

$\underline{e} = (4/5)\underline{i} + (-3/5)\underline{j}$ (2p). Tehát az iránymenti derivált

$$\left. \frac{df}{d\underline{e}} \right|_{P_0} = \frac{24}{5}. \quad (3p)$$

5. feladat (15 pont)

Az integrálás sorrendjének felcserélésével számoljuk ki az alábbi integrált:

$$\int_0^4 \int_{\sqrt{x}}^2 \sqrt{1+y^3} \, dy \, dx$$

Mo.

$$\begin{aligned} \int_0^4 \int_{\sqrt{x}}^2 \sqrt{1+y^3} \, dy \, dx &\stackrel{(5p)}{=} \int_0^2 \int_0^{y^2} \sqrt{1+y^3} \, dx \, dy \stackrel{(2p)}{=} \\ &= \int_0^2 y^2 \sqrt{1+y^3} \, dy \stackrel{(5p)}{=} \frac{1}{3} \left[\frac{(1+y^3)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \right]_0^2 \stackrel{(3p)}{=} \frac{52}{9}. \end{aligned}$$

6. feladat (10 pont)

Határozza meg az $x = 0$, $x = 2$, $y = 0$, $y = 1$, $z = 0$, $z = x + y^3$ felületek által határolt tartomány térfogatát.

Mo.

$$\iiint_V 1 dV \stackrel{(2p)}{=} \int_0^2 \int_0^1 \int_0^{x+y^3} 1 \, dz \, dy \, dx \stackrel{(3p)}{=} \int_0^2 \int_0^1 x+y^3 \, dy \, dx \stackrel{(3p)}{=} \int_0^2 x+1/4 \, dx \stackrel{(2p)}{=} \frac{5}{2}.$$

IMSC feladat (15 IMSC pont) Adott a síkon n tömegpont $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$, m_1, \dots, m_n tömegekkel. A sík mely pontjára vonatkoztatva lesz a rendszer tehetetlenségi nyomatéka minimális? (n darab egyenként m_i tömegű, a vonatkoztatási ponttól egyenként r_i távolságra elhelyezett tömegpontból álló merev test tehetetlenségi nyomatéka $\sum_{i=1}^n m_i r_i^2$).

Mo. Keressük az $f(x, y) = \sum_{i=1}^n m_i ((x - x_i)^2 + (y - y_i)^2)$ minimumát a síkon **(4p)** . Lo-

kális szélsőérték hely ott lehet, ahol a gradiens 0 **(2p)** : $f'_x = \sum_{i=1}^n m_i 2(x - x_i) = 0$,

ha $x = \frac{\sum_{i=1}^n m_i x_i}{\sum_{i=1}^n m_i}$ és $f'_y = \sum_{i=1}^n m_i 2(y - y_i) = 0$, ha $y = \frac{\sum_{i=1}^n m_i y_i}{\sum_{i=1}^n m_i}$ **(4p)** . Eb-

ben a pontban lokális minimum van, hiszen $f''_{xx} = \sum_{i=1}^n 2m_i = f''_{yy} > 0$, $f''_{xy} = 0$, így

$f''_{xx} f''_{yy} - (f''_{xy})^2 > 0$ **(3p)** . Mivel az egész síkon ez az egyetlen lokális szélsőérték hely, így ez egyben abszolút minimum is. **(2p)**
