

**2. vizsga**

A vizsga időtartama 100 perc. Számológépet lehet használni. Amennyiben egy feladat máshogy nem rendelkezik, a számszerű végeredményeket 4 tizedesjegyre kerekítsük, vagy normál tört alakban adjuk meg. Minden feladat 10 pontot ér. A teljes pontszám eléréséhez a megoldás menete is szükséges, beleértve az egyes lépéseknél felhasznált tulajdonságok és tételek jelzését. A vizsga első 30 percében nem lehet a termet elhagyni.

1. a) Legyen  $X$  egy valószínűségi változó. Mit nevezünk az  $X$  sztenderdizáltjának?  
 b) Mit jelent az, hogy a  $T(X_1, \dots, X_n)$  statisztika *torzítatlan becslés* a háttéreloszlás egy  $\theta$  paraméterére? Mit jelent az, hogy ugyanezen statisztika *aszimptotikusan torzítatlan becslés* ugyanezen paraméterre? A tanult alapstatisztikák közül melyikről bizonyítottuk az előadáson, hogy aszimptotikusan torzítatlan, de nem torzítatlan becslés valamilyen paraméterre?
2. Választunk két számot egymástól függetlenül a  $(0; 1)$  intervallumon. Mi a valószínűsége, hogy a második választott szám legalább akkora, mint az első szám fele, de legfeljebb akkora, mint az első szám kétszerese?
3. Béla minden héten lottózik, továbbá a kedvenc száma a 42. Elhatározza, hogy a következő 52 hét mindegyikén feljegyzi magának a húzott számokat, hogy különböző statisztikákat készíthessen. Többek között azt is meg akarja figyelni, hogy hányszor húzzák ki a kedvenc számát. Mi a valószínűsége annak, hogy a következő 52 hét alatt legalább 7-szer húznak 42-est?
4. Az  $X$  és  $Y$  valószínűségi változók együttes eloszlását tartalmazza az alábbi táblázat. Határozzuk meg az  $Y$ -nak az  $X$ -re vett lineáris regresszióját.

	$X$		
$Y$		0	1
0		2/5	1/5
2		1/10	3/10

5. Legyenek  $X \sim N(3; 4)$  és  $Y \sim N(4; 5)$  azonos valószínűségi mezőn értelmezett független valószínűségi változók. Határozzuk meg  $X$  és  $Y$  korrelációját, valamint  $X + Y$  várható értékét és szórását. Mi az  $X + Y$  eloszlása?
6. Tegyük fel, hogy egy nagyvárosban a hétköznapokon történt közlekedési balesetek napi száma normális eloszlást követ, melynek szórása ismeretlen. Egymás után 10 hétköznapon feljegyeztük a balesetek számát, melyek a következők: 32, 27, 37, 42, 28, 19, 30, 26, 35, 37. Elfogadható-e 95%-os megbízhatósági szinten az a hipotézis, hogy egy hétköznap átlagosan 30 baleset történik (azaz a balesetek számának várható értéke 30). Döntsünk ugyanerről a hipotézisről 98%-os megbízhatósági szint mellett is.

Eloszlás neve	Jelölés	ran $X$	$\mathbb{P}(X = k)$ v. $F_X(t)$	$f_X(t)$	$\mathbb{E}(X)$	$\mathbb{D}^2(X)$
indikátor	$\mathbf{1}(p)$	$\{0, 1\}$	$1 - p, p$	-	$p$	$p(1 - p)$
binomiális	$B(n; p)$	$\{0, 1, \dots, n\}$	$\binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$	-	$np$	$np(1 - p)$
geometriai	$Geo(p)$	$\mathbb{N}^+$	$(1 - p)^{k-1} p$	-	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
egyenletes	$U(a; b)$	$(a; b)$	$\frac{t-a}{b-a}$ (ha $t \in (a; b)$ )	$\frac{1}{b-a}$ (ha $t \in (a; b)$ )	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
exponenciális	$Exp(\lambda)$	$[0; \infty)$	$1 - e^{-\lambda t}$ (ha $t \in (0; \infty)$ )	$\lambda e^{-\lambda t}$ (ha $t \in (0; \infty)$ )	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
normális	$N(\mu; \sigma^2)$	$\mathbb{R}$	$\Phi\left(\frac{t-\mu}{\sigma}\right)$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	$\mu$	$\sigma^2$

