

**3. vizsga**

A vizsga időtartama 100 perc. Számológépet lehet használni. Amennyiben egy feladat máshogy nem rendelkezik, a számszerű végeredményeket 4 tizedesjegyre kerekítsük, vagy normál tört alakban adjuk meg. Minden feladat 10 pontot ér. A teljes pontszám eléréséhez a megoldás menete is szükséges, beleértve az egyes lépéseknél felhasznált tulajdonságok és tételek jelzését. A vizsga első 30 percében nem lehet a termet elhagyni.

1. a) Írjuk fel a szita-formulát két ill. három eseményre is.  
 b) Hogyan definiáltuk az előadáson egy folytonos valószínűségi változó várható értékét?
2. A normális eloszlású  $X$  valószínűségi változóra  $\mathbb{E}(X^2) = 5$  és  $\mathbb{P}(X > 1) = \frac{1}{2}$  teljesül. Adjuk meg  $X$  sztenderdizáltját.
3. Egy urnában 1 zöld, 2 kék és 3 piros golyó van. Véletlenszerűen kihúzzunk 2 golyót visszatevés nélkül. Jelölje  $X$  a kihúzott kék, míg  $Y$  a kihúzott zöld golyók számát. Adjuk meg  $X$  és  $Y$  együttes eloszlását.
4. Egy társasjátékban minden egyes kör úgy zajlik, hogy a sorra kerülő játékos dob egy (hat oldalú) dobókockával, előrelép a bábujával a táblán annyi mezőt, amennyit dobott, majd végrehajtja annak a mezőnek az utasításait, amelyre érkezett. Tegyük fel, hogy az egyes dobások egymástól függetlenek, továbbá a játékban nincs olyan, hogy valaki kimarad egy körben (tehát minden játékos dob minden körben), valamint a játékosok bábui csak a dobások következtében mozoghatnak a táblán (tehát a mezők utasításai vagy egyéb szabályok nem mozgatják a bábukat). Közelítőleg mennyi a valószínűsége, hogy egy adott játékos 50 kör alatt összesen legalább 180 mezőnyit lép előre?
5. Legyenek  $X$  és  $Y$  azonos valószínűségi mezőn értelmezett, azonos eloszlású valószínűségi változók  $\frac{1}{2}$  várható értékkel és  $\frac{1}{4}$  szórással. Tegyük fel továbbá, hogy  $\mathbb{D}(X + Y) = \frac{1}{4}$  is teljesül. Határozzuk meg  $X$  és  $Y$  kovarianciáját illetve az  $\mathbb{E}(XY)$  várható értéket. Lehetséges-e, hogy  $X$  és  $Y$  függetlenek?
6. Egy 10 elemű minta alapján meghatároztuk a hozzá tartozó tapasztalati eloszlásfüggvényt, amelyre az

$$F^*(t) = \begin{cases} 0 & \text{ha } t \leq 1, \\ 2/5 & \text{ha } 1 < t \leq 3, \\ 1/2 & \text{ha } 3 < t \leq 7, \\ 7/10 & \text{ha } 7 < t \leq 8, \\ 1 & \text{ha } 8 < t. \end{cases}$$

formula adódott. Számoljuk ki ez alapján a mintaátlagot és a korrigált tapasztalati szórást.

Eloszlás neve	Jelölés	ran $X$	$\mathbb{P}(X = k)$ v. $F_X(t)$	$f_X(t)$	$\mathbb{E}(X)$	$\mathbb{D}^2(X)$
indikátor	$\mathbf{1}(p)$	$\{0, 1\}$	$1 - p, p$	-	$p$	$p(1 - p)$
binomiális	$B(n; p)$	$\{0, 1, \dots, n\}$	$\binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$	-	$np$	$np(1 - p)$
geometriai	$Geo(p)$	$\mathbb{N}^+$	$(1 - p)^{k-1} p$	-	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
egyenletes	$U(a; b)$	$(a; b)$	$\frac{t-a}{b-a}$ (ha $t \in (a; b)$ )	$\frac{1}{b-a}$ (ha $t \in (a; b)$ )	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
exponenciális	$Exp(\lambda)$	$[0; \infty)$	$1 - e^{-\lambda t}$ (ha $t \in (0; \infty)$ )	$\lambda e^{-\lambda t}$ (ha $t \in (0; \infty)$ )	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
normális	$N(\mu; \sigma^2)$	$\mathbb{R}$	$\Phi\left(\frac{t-\mu}{\sigma}\right)$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	$\mu$	$\sigma^2$

