

# VEKTOROK

## (I.) Jelölések:

$\mathbf{a}$  – vektor

$a_n$  –  $\mathbf{a}$  vektor  $n$ . koordinátája

## (II.) Determinánsok kifejtése

Harmadrendű determináns másodrendűvé alakítása:

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = a \begin{vmatrix} e & f \\ h & i \end{vmatrix} - b \begin{vmatrix} d & f \\ g & i \end{vmatrix} + c \begin{vmatrix} d & e \\ g & h \end{vmatrix}$$

Másodrendű determináns szorzatok különbségévé alakítása:

$$\begin{vmatrix} j & k \\ l & m \end{vmatrix} = jm - kl$$

## (III.) Az egyenes egyenletei

### (IIIa.) Az egyenes vektoregyenlete

Az egyenes egy  $P_0$  pontjának helyvektora:  $\mathbf{r}_0 = (x_0, y_0, z_0)$

Az egyenes egy  $P$  pontjának helyvektora:  $\mathbf{r} = (x, y, z)$

Az egyenes irányvektora:  $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$

$\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}_0 + t\mathbf{v}$ , ahol  $t \in \mathbb{R}$

### (IIIb.) Az egyenes paraméteres egyenletrendszere

Az egyenes egy  $P_0$  pontjának helyvektora:  $\mathbf{r}_0 = (x_0, y_0, z_0)$

Az egyenes egy  $P$  pontjának helyvektora:  $\mathbf{r} = (x, y, z)$

Az egyenes irányvektora:  $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$

$$\left. \begin{array}{l} x = x_0 + tv_1 \\ y = y_0 + tv_2 \\ z = z_0 + tv_3 \end{array} \right\} \text{ahol } t \in \mathbb{R}$$

⇓

$$t = \frac{x - x_0}{v_1} = \frac{y - y_0}{v_2} = \frac{z - z_0}{v_3}$$

## (IV.) A sík egyenletei

### (IVa.) A sík vektoregyenlete

A sík normálvektora:  $\mathbf{n}$

A sík két tetszőleges pontja közti vektor:  $\mathbf{a}$

$\mathbf{n} \cdot \mathbf{a} = 0$

(IVb.) A sík alapegyenlete

A sík egy  $P_0$  pontjának helyvektora:  $\mathbf{r}_0 = (x_0, y_0, z_0)$

A sík egy  $P$  pontjának helyvektora:  $\mathbf{r} = (x, y, z)$

A sík normálvektora:  $\mathbf{n} = (n_1, n_2, n_3)$

$$n_1(x - x_0) + n_2(y - y_0) + n_3(z - z_0) = 0$$

(1.) Egységvektorok

Definíció szerint  $\mathbf{i}$ ,  $\mathbf{j}$ ,  $\mathbf{k}$  egymásra merőleges, egység nagyságú vektorok. Minden tetszőleges vektor felírható ezek *lineáris kombinációjaként*:  $\mathbf{a} = a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}$ .

(2.) Vektorműveletek

(2a.) Összeadás és kivonás

$$\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)$$

$$\mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)$$

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3)$$

$$\mathbf{a} - \mathbf{b} = (a_1 - b_1, a_2 - b_2, a_3 - b_3)$$

(2b.) Számszoros

$$\lambda \in \mathbb{R}$$

$$\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)$$

$$\lambda\mathbf{a} = (\lambda a_1, \lambda a_2, \lambda a_3)$$

(2c.) Skaláris szorzat

$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| \cdot |\mathbf{b}| \cdot \cos \alpha$ , ahol  $\alpha$  az  $\mathbf{a}$  és  $\mathbf{b}$  által bezárt szög

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a}$$

$$\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{c}$$

$$\mathbf{a} \cdot (\lambda\mathbf{b}) = (\lambda\mathbf{a}) \cdot \mathbf{b} = \lambda(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}), \text{ ahol } \lambda \in \mathbb{R}$$

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = |\mathbf{a}|^2$$

illetve

$$\mathbf{a} = a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}$$

$$\mathbf{b} = b_1\mathbf{i} + b_2\mathbf{j} + b_3\mathbf{k}$$

$$\Rightarrow \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \sum_{i=1}^3 a_i \cdot b_i$$

mivel

$$\mathbf{i} \cdot \mathbf{i} = \mathbf{j} \cdot \mathbf{j} = \mathbf{k} \cdot \mathbf{k} = 1$$

$$\mathbf{i} \cdot \mathbf{j} = \mathbf{j} \cdot \mathbf{k} = \mathbf{i} \cdot \mathbf{k} = 0$$

$$\Rightarrow (a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}) \cdot (b_1\mathbf{i} + b_2\mathbf{j} + b_3\mathbf{k}) = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$$

(2d.) Vektoriális szorzat

$|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = |\mathbf{a}| \cdot |\mathbf{b}| \cdot \sin \alpha$ , ahol  $\alpha$  az  $\mathbf{a}$  és  $\mathbf{b}$  által bezárt szög

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \perp \mathbf{a}, \mathbf{b}$$

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = -(\mathbf{b} \times \mathbf{a})$$

$$\mathbf{a} \times \mathbf{a} = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{a} \times (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \times \mathbf{b} + \mathbf{a} \times \mathbf{c}$$

$$\mathbf{a} \times (\lambda \mathbf{b}) = (\lambda \mathbf{a}) \times \mathbf{b} = \lambda (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \text{ ahol } \lambda \in \mathbb{R}$$

$$\mathbf{i} \times \mathbf{i} = \mathbf{j} \times \mathbf{j} = \mathbf{k} \times \mathbf{k} = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{i} \times \mathbf{j} = \mathbf{k}$$

$$\mathbf{j} \times \mathbf{k} = \mathbf{i}$$

$$\mathbf{k} \times \mathbf{i} = \mathbf{j}$$

$\mathbf{a} \times \mathbf{b}$  kiszámítása derékszögű koordinátarendszerben:

$$\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3) \text{ és } \mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)$$

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

(2e.) Vegyes szorzat

$$\mathbf{abc} = \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$$

$$\mathbf{abc} = \mathbf{bca} = \mathbf{cab} = -\mathbf{bac} = -\mathbf{acb} = -\mathbf{cba}$$

$$\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)$$

$$\mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)$$

$$\mathbf{c} = (c_1, c_2, c_3)$$

$$\mathbf{abc} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

(3.) Elemi feladatok vektorokkal

(3a.) Merőlegesség vizsgálata

$$\mathbf{a}, \mathbf{b} \neq \mathbf{0}$$

$$\mathbf{a} \perp \mathbf{b} \Leftrightarrow \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$$

(3b.) Merőleges vetület képzése

$\mathbf{b}$ -nek az  $\mathbf{a}$  irányába eső előjeles merőleges vetülete:

$$\mathbf{b} \cdot \frac{\mathbf{a}}{|\mathbf{a}|} = |\mathbf{b}| \cos \alpha, \text{ ahol } \alpha \text{ az } \mathbf{a} \text{ és } \mathbf{b} \text{ által bezárt szög}$$

(3c.) Párhuzamosság vizsgálata

$$\mathbf{a}, \mathbf{b} \neq \mathbf{0}$$

$$\mathbf{a} \parallel \mathbf{b} \Leftrightarrow \mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{0}$$

(3d.) Területszámítás

**a** és **b** által kifeszített paralelogramma területe

$$T = |\mathbf{a} \times \mathbf{b}|$$

(3e.) Egysíkúság vizsgálata

**a**, **b**, **c** egysíkú vektorok  $\Leftrightarrow \mathbf{abc} = \mathbf{0}$

(3f.) Térfogatszámítás

**a**, **b**, **c** vektorok által kifeszített paralelepipedon térfogata

$$V = |\mathbf{abc}|$$

(3g.) Két pont távolsága

$$A(a_1; a_2; a_3)$$

$$B(b_1; b_2; b_3)$$

$$d = \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2 + (b_3 - a_3)^2}$$

(3h.) P pont és e egyenes távolsága

Tetszőleges  $Q$  pont kijelölése  $e$ -n.  $\Rightarrow \overline{PQ} = \mathbf{a}$

$Q$ -ból induló,  $e$  irányába mutató vektor legyen  $\mathbf{v}$

$$d = \frac{|\mathbf{a} \times \mathbf{v}|}{|\mathbf{v}|}$$

(3i.) P pont és S sík távolsága

$S$ -en tetszőleges  $Q$  pont kijelölése  $\Rightarrow \overline{PQ} = \mathbf{a}$

$S$  normálvektora  $\mathbf{n}$

$$d = \frac{|\mathbf{n} \cdot \mathbf{a}|}{|\mathbf{n}|}$$