

VIK, Műszaki Informatika
ANALÍZIS (2)

Feladatgyűjtemény
(Korábbi zárthelyi és vizsgafeladatok)
Oktatási segédanyag

Fritz Józsefné
Kónya Ilona

2000. február

Szerkesztette: Győri Sándor

I. rész

Feladatok

1. Differenciálegyenletek

1.1.

1.1.1.

$$y' = y^3 \cdot \sin 3x; \quad y\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1; \quad y(x) = ?$$

1.1.2.

$$y' = (1 - y) \cos 2x \quad y(x) = ?$$

1.1.3.

Oldja meg az alábbi differenciálegyenletet!

$$y' = \frac{\operatorname{sh} y}{\operatorname{ch} y} \operatorname{sh} x$$

1.1.4.

Oldja meg az alábbi differenciálegyenletet!

$$y' = \frac{3y - 2}{2x + 1}, \quad x > 0$$

1.1.5.

Adja meg az $y' = \frac{(y + 1)^4}{x^2}$ differenciálegyenlet összes megoldását!

1.1.6.

Oldja meg az alábbi differenciálegyenletet!

$$y' = \frac{(y + 2)^2}{1 + x^2}; \quad y(1) = -1$$

1.1.7.

Írja fel az

$$e^y y' = e^y - e$$

differenciálegyenlet $y(0) = 1$, illetve $y(0) = 2$ kezdeti feltételeket kielégítő megoldásait!

1.1.8.

Oldja meg az

$$y' = \frac{3y^2 + 4}{y(2x + 5)}, \quad x, y > 0$$

differenciálegyenletet!

1.1.9.

$$y' = \frac{y^2 - 2y + 3}{(y - 1)(x + 1)^3} \quad y(x) = ?$$

1.1.10.

Tekintsük az alábbi differenciálegyenletet:

$$y' = \frac{y^2 - 6y + 8}{(2y - 6)(x + 5)}$$

- a) Határozza meg az $x_0 = 0$, $y_0 = 2$ ponton áthaladó megoldását!
- b) Határozza meg az $x_0 = 0$, $y_0 = 1$ ponton áthaladó megoldását!

1.2.**1.2.1.**

- a) Milyen típusú differenciálegyenlet az

$$y' - \frac{y}{x} = 2 \sin x, \quad x > 0,$$

Milyen alakú az általános megoldása?

- b) Mutassa meg, hogy

$$y_p = 2x \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt$$

megoldása ennek a differenciálegyenletnek!

- c) Írja fel az általános megoldást! (y_p nem hozható egyszerűbb alakra!)

1.2.2.

a) $y' - \frac{2y}{x} = 0 \quad y(x) = ?$

b) $y' - \frac{2y}{x} = x^3 \quad y(x) = ?$

1.2.3.

Oldja meg az $y' - \frac{y}{x} = \frac{x^2}{1 + x^2}$ differenciálegyenletet!

1.2.4.

$$y' = 4xy + 2x \qquad y(x) = ?$$

1.2.5.

Írja fel az

$$y' + \frac{3}{x}y = 5x - 4$$

differenciálegyenlet összes megoldását!

1.2.6.

$$y' - 2xy = x^3e^{x^2} \qquad y(x) = ?$$

1.2.7.

$$y' - \frac{4}{x}y = x^4e^{-2x} \qquad y(x) = ?$$

1.2.8.

Határozza meg az

$$y' - \frac{e^x}{e^x + 5}y = \frac{5 + e^x}{e^x}$$

differenciálegyenlet általános megoldását!

1.2.9.

a) $y' - \frac{3}{x}y = -3x^4 \qquad y(x) = ?$

b) $y' + \frac{y}{x} = x^4y^4 \qquad y(x) = ? \quad (u = \frac{1}{y^3} \text{ helyettesítéssel oldja meg!})$

1.3.**1.3.1.**

$u = \frac{y}{x}$ helyettesítéssel oldja meg az

$$x^2y' + xy = x^2 + y^2$$

differenciálegyenletet! ($x > 0$ feltételezéssel dolgozhat)

1.3.2.

$$y' = (2x + y)^2 - 2, \quad y(1) = -3, \quad y(x) = ?$$

($u = 2x + y$ új változó bevezetésével oldja meg!)

1.3.3.

Vezesse be az $u = y - 3x$ új változót, majd keresse meg az

$$y' = (y - 3x)^2, \quad y\left(\frac{-1}{\sqrt{3}}\right) = 0$$

kezdeti érték probléma egy megoldását!

1.3.4.

Oldja meg az alábbi differenciálegyenletet az $u = y^3$ helyettesítéssel!

$$3y' - 2y = \frac{2 + e^{3x}}{y^2}$$

1.3.5.

Hajtsa végre az $u = xy^3$ helyettesítést a

$$3xy^2y' - y^3 = x^3$$

differenciálegyenletnél! A kapott egyenletet nem kell megoldania!

1.3.6.

Oldja meg az alábbi kezdeti érték problémát az $y' = p(y)$ helyettesítéssel!

$$y'' = \frac{(y')^2}{y} \quad ; \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 2$$

1.4.**1.4.1.**

Tekintsük az $y' = x^2 + y^3$ differenciálegyenletet!

a) Indokolja meg, hogy az $x_0 = 1$ pontnak van olyan környezete, melyben az $y(1) = -1$ kezdeti érték probléma egyértelműen megoldható!

Jelöljük ezt a megoldást $y = \varphi(x)$ -szel!

b) A differenciálegyenlet megoldása nélkül határozza meg φ -nek az $x_0 = 1$ körüli harmadfokú Taylor polinomját!

c) Milyen lokális tulajdonsága van φ -nek az $x_0 = 1$ pontban?

1.4.2.

$$y' = \frac{y - x + 1}{y - x}, \quad y \neq x$$

- a) Indokolja meg, hogy a fenti differenciálegyenletnek pontosan egy megoldása halad át az $x_0 = 2$, $y_0 = 5$ ponton!
- b) Milyen irányú az iránymező ebben a pontban? Mely pontokban lesz ugyanilyen irányú az iránymező?
- c) Írja fel az a)-beli megoldásgörbe $x_0 = 2$ pontbeli másodfokú Taylor polinomját!

1.4.3.

Tekintsük az alábbi differenciálegyenletet!

$$y' = y^3 - e^{3x}$$

- a) Igaz-e, hogy ennek a differenciálegyenletnek minden ponton át halad megoldásgörbéje?
- b) Milyen szög alatt metszi az y tengelyt az $x_0 = 0$, $y_0 = \sqrt[3]{2}$ ponton áthaladó megoldásgörbe?
- c) Mely pontokon áthaladó megoldásgörbéknek van lokális maximuma illetve minimuma éppen a szóbanforgó pontban?

1.4.4.

$$y' = x^2 + y^2 - 2xy$$

- a) Rajzolja fel az $(1, 2)$ ponton áthaladó izoklínát! (Rajzoljon be néhány vonalelemet is!)
- b) A differenciálegyenlet megoldása nélkül vizsgálja meg, hogy hol lehet lokális szélsőértéke a megoldásgörbéknek! Ahol van, ott milyen jellegű a lokális szélsőérték?

1.5.

1.5.1.

a) $y'' - 2y' - 3y = 0$

Adja meg az általános megoldást!

Adja meg az $y(0) = 0$, $y'(0) = 4$ feltételeket kielégítő megoldást!

b) $y'' - 2y' - 3y = 3x$ $y(x) = ?$

c) $y'' - 2y' - 3y = -2 \sin x - 6 \cos x$ $y(x) = ?$

1.5.2.

$$y'' + 2y' - 3y = e^{5x} \quad y(x) = ?$$

1.5.3.

Írja fel az alábbi differenciálegyenlet általános megoldását:

$$y'' - 6y' + 9y = 27x^2$$

1.5.4.

$$y'' + y' - 2y = 6e^x + 2x \quad y(x) = ?$$

1.5.5.

$$y'' + 8y' = 34 \cdot \sin 2x \quad y(x) = ?$$

1.5.6.

Határozza meg a

$$y'' + 10y' + 29y = -40e^{29x}$$

általános megoldását!

1.5.7.

Adja meg α értékét úgy, hogy az

$$y'' - \alpha y = e^{5x}, \quad \alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

differenciálegyenletnél külső rezonancia lépjen fel!

Ezen α érték esetén válaszoljon az alábbi kérdésekre:

- Milyen szerkezetű az általános megoldás?
- Milyen alakban kereshető egyik megoldása?
- Határozza meg az általános megoldást! (A fenti α érték esetén.)

1.5.8.

A β paraméter függvényében keresse meg az alábbi differenciálegyenlet megoldását!

$$y'' + 2\beta y' + y = 0$$

1.5.9.

- Írja fel a

$$y'' + y = \cos x$$

differenciálegyenlet általános megoldását!

- Az α paraméter mely értéke mellett lesz periodikus (azaz "tisztá" szinuszos vagy koszinuszos tagokat tartalmazó) az

$$y'' + \alpha y = \cos x$$

differenciálegyenlet minden megoldása;

1.5.10.

Oldja meg az alábbi differenciálegyenletet!

$$y''' + 9y' = 3x^2$$

1.5.11.

$$y''' + 4y' = 24x^2 \quad y(x) = ?$$

1.6.**1.6.1.**

Mutassa meg, hogy az

$$(3(x-1)^2y^2 + 2e^{2x}) dx + (2(x-1)^3y + 2 \cos 2y) dy = 0$$

differenciálegyenlet egzakt, és oldja meg!

1.6.2.

Mutassa meg, hogy az alábbi differenciálegyenlet egzakt, és oldja meg a differenciálegyenletet!

$$(e^{3y^2} + 2x + 2 + 2xy^3) dx + (6xye^{3y^2} + 9y^2 + 3x^2y^2) dy = 0 \quad y(1) = 0$$

1.6.3.

Oldja meg az alábbi differenciálegyenletet!

$$(x^3 + 3xy^3 - 1) dx + (3x^2y^2 + e^y) dy = 0$$

1.6.4.

Mutassa meg, hogy az alábbi differenciálegyenlet egzakt, és határozza meg az $y(2) = 0$ kezdeti feltételt kielégítő megoldását:

$$(1 + e^{xy} + xye^{xy}) dx + \left(x^2e^{xy} + \frac{2y}{1+y^2}\right) dy = 0$$

1.6.5.

Mutassa meg, hogy az alábbi differenciálegyenlet egzakt és adja meg az általános megoldását!

$$(2ye^{y^2+2x} + 6x) dx + ((1 + 2y^2)e^{y^2+2x} + 3) dy = 0$$

1.6.6.

Oldja meg az alábbi differenciálegyenletet!

$$(2xe^{2y} + 6x + y \cdot \cos xy) dx + (2x^2e^{2y} - 6 + x \cdot \cos xy) dy = 0 \quad y(1) = 0,$$

1.6.7.

Oldja meg az alábbi kezdeti érték problémát:

$$(2e^{2x+y} + x) dx + (e^{2x+y} + 3y^2) dy = 0, \quad x_0 = 0, y_0 = 1$$

1.6.8.

Mutassa meg, hogy az alábbi differenciálegyenlet egzakt, és határozza meg az $y(2) = 0$ kezdeti feltételt kielégítő megoldását:

$$(4x^3y^3 + 3x^2y^2 + 2x) dx + (3x^4y^2 + 2x^3y - 4y^3) dy = 0$$

1.6.9.

Keressen $t = \frac{x}{y}$ -től függő multiplikátort az

$$\frac{1}{y} dx + yx dy = 0$$

differenciálegyenlethez! (A differenciálegyenletet nem kell megoldania!)

1.6.10.

$$g(x, y) dx + h(x, y) dy = 0$$

- a) Milyen feltételnek kell a g és h függvényeknek megfelelniük, hogy a nem egzakt differenciálegyenlet $\mu(x - y^2)$ multiplikátorral szorozva egzakt legyen?
 b) Alkalmazza eredményét az alábbi differenciálegyenletre, és határozza meg a multiplikátort:

$$(6x + 6y - 2y^2) dx - (8xy + 15y^2 - 3x) dy = 0$$

(Ne oldja meg az egzakt differenciálegyenletet!)

1.7.**1.7.1.**

Keresse meg a következő differenciálegyenlet-rendszerek megoldását!

$$\dot{\underline{x}} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \underline{x}$$

$$\dot{\underline{x}} = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \underline{x}$$

1.7.2.

Írja fel az alábbi differenciálegyenlet-rendszer egyik megoldását!

$$\dot{\underline{x}} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \underline{x}$$

1.7.3.

Az alábbi differenciálegyenlet-rendszer egyik megoldása $\underline{x}_1 = e^{2t} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. Keressük meg az \underline{x}_1 -től lineárisan független megoldásokat!

$$\dot{\underline{x}} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix} \underline{x}$$

1.7.4.

Határozza meg az alábbi differenciálegyenlet-rendszer megoldáshalmazának egy kétdimenziós alterét!

$$\dot{\underline{x}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \underline{x}$$

1.7.5.

Írjuk fel az alábbi differenciálegyenlet-rendszerek általános megoldását két lineárisan független megoldásvektor lineáris kombinációjaként!

a) $\dot{\underline{x}} = \begin{pmatrix} 2 & 9 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \underline{x}$

b) $\dot{\underline{x}} = \begin{pmatrix} 2 & -16 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \underline{x}$

c) $\dot{\underline{x}} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \underline{x}$

1.7.6.

Írjuk fel az alábbi differenciálegyenlet-rendszerek általános megoldását!

a) $\dot{\underline{x}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 16 & 1 \end{pmatrix} \underline{x} + \begin{pmatrix} e^{-t} \\ 0 \end{pmatrix}$

b) $\dot{\underline{x}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 16 & 1 \end{pmatrix} \underline{x} + \begin{pmatrix} 1 \\ e^{2t} \end{pmatrix}$

c) $\dot{\underline{x}} = \begin{pmatrix} 1 & -9 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \underline{x} + \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$

$$\text{d) } \dot{\underline{x}} = \begin{pmatrix} 1 & -9 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \underline{x} + \begin{pmatrix} e^t \\ e^{-t} \end{pmatrix}$$

$$\text{e) } \dot{\underline{x}} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \underline{x} + \begin{pmatrix} t \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{f) } \dot{\underline{x}} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \underline{x} + \begin{pmatrix} t \\ 1 \end{pmatrix}$$

2. Függvénysorozatok, függvénysorok

2.1.

2.1.1.

Legyen

$$f_n(x) = \frac{1}{2x^2 + n + 5} + 3x$$

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = ?, \quad D_f = ?$$

2.1.2.

Legyen

$$f_n(x) = \frac{x^2 - xn^3}{x^4 + n + 3}$$

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = ?, \quad D_f = ?$$

2.1.3.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{xn^3 + n^2 + 1}{xn^3 + (x+2)n^2 + 1} = ?, \quad \text{ha } x \geq 0$$

2.1.4.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2n^4 + n^2 + 3}{2xn^4 + (x+5)n^2 + 2} = ?, \quad \text{ha } x \in [0, \infty).$$

Egyenletes-e a konvergencia?

2.1.5.

Egyenletesen konvergens-e az

$$f_n(x) = \frac{1}{1 + nx^2}$$

függvénysorozat a $(-\infty, \infty)$ intervallumon? $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = ?$

2.1.6.

$$f_n(x) = \frac{n + \sin nx}{n}$$

a) $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = ?$

b) $\|f_n - f\| = ?$

2.1.7.

Legyen

$$f_n(x) = \frac{1}{x^2 + n^4}$$

a) $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x) = ?$

b) $\|f_n - f\| = ?$

2.1.8.

$$f_n(x) = \frac{x}{n^2 + 4x^2}$$

a) $f(x) = ?$, $D_f = ?$

b) Határozza meg az $\|f - f_n\|$ normát a konvergencia tartományban!
Egyenletes-e a konvergencia?

2.1.9.

Legyen

$$f_n(x) = \frac{-x^2 + (n+4)x}{n}, \quad 0 \leq x \leq 3$$

a) $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = ?$

b) $\|f_n - f\| = ?$

c) Egyenletes-e a konvergencia?

2.1.10.

$$f_n(x) = \frac{1}{x + \sqrt[n]{n}}, \quad x \geq 0$$

a) $f(x) = ?$

b) $\|f_n - f\| = ?$

c) Egyenletes-e a konvergencia a $[0, \infty)$ -on?

2.1.11.

$$f_n(x) = \frac{x^2}{1 + n^2 x^2}$$

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = ?$$

Határozza meg az $\|f_n - f\|$ értékét a konvergencia tartományban!
Egyenletesen konvergens-e itt a függvénysorozat?

2.1.12.

$$f_n(x) = e^{-nx^2} + 2x^2 \quad x \in [0, \infty)$$

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = ?$$

Egyenletes-e a konvergencia a $[0, 1]$, illetve az $[1, 2]$ intervallumon?

2.1.13.

$$f_n(x) = e^{2x} + \frac{\sin^2(n^3 x^2)}{\sqrt{2n^2 + 3}}$$

a) $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = ?$

b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx = ?$

2.2.

2.2.1.

$$\sum_{n=1}^{\infty} 2^n e^{xn}$$

Adja meg a sor konvergencia tartományát és összegfüggvényét!

2.2.2.

$$\sum_{n=2}^{\infty} 2 (\ln x)^n$$

Adja meg a sor konvergencia tartományát és összegfüggvényét!

2.2.3.

Egyenletesen konvergens-e a $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin kx}{k^2 + \sqrt{k} + x^2}$ függvénysor?

2.2.4.

Egyenletesen konvergens-e az alábbi sor?

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(x\sqrt{k} + 1)}{5x^2 + 3^k}$$

2.2.5.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{arctg}(n^3 x^2 + 1)}{2^n + 3x^2}$$

Milyen x -re folytonos a sor összegfüggvénye?

2.2.6.

Felcserélhető-e a \sum és az integrál jel az alábbi kifejezésben?

$$\int_0^{\pi} \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{2^k \sin kx}{3^k} \right) dx$$

2.2.7.

Milyen $x \in \mathbb{R}$ esetén folytonos az alábbi sor összegfüggvénye?

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{3^n + 2^n}$$

Milyen intervallumon lehet tagonként integrálni?

2.2.8.

a) Milyen x -re konvergens a

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \frac{x+1}{n^2}}{n^2 + 3n + 8}$$

függvénysor?

b) Mutassa meg, hogy $\forall x \in \mathbb{R}$ esetén differenciálható a sor összegfüggvénye!

2.2.9.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2\sqrt{n}x + 1)}{n^2\sqrt{n} + n + 9}$$

- a) Milyen x -re konvergencia a függvényesor?
 b) Mutassa meg, hogy $\forall x \in \mathbb{R}$ esetén differenciálható a sor összegfüggvénye!

2.2.10.

Igaz-e az alábbi állítás minden valós x -re?

$$\frac{d}{dx} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 + \cos(n^3 + \sqrt{n}x)}{4\sqrt{n^5} + 3} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{d}{dx} \frac{1 + \cos(n^3 + \sqrt{n}x)}{4\sqrt{n^5} + 3}$$

2.3.

2.3.1.

Adja meg a

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(k!)^2}{(2k)!} x^k$$

sor konvergencia sugarát!

2.3.2.

Határozza meg az alábbi hatványsor konvergencia sugarát!

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)^{2n}}{(2n)!} x^n$$

2.3.3.

Keresse meg a $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{3^n} (x+1)^n$ sor konvergencia tartományát!

2.3.4.

Adja meg az alábbi sor konvergenciatartományát!

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{3^{2n}}{n^2} x^n$$

2.3.5.

Milyen x -re konvergencia a $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n^4} (x-4)^n$ sor?

2.3.6.

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(k+3)x^k}{4^{k-1}}$$

- a) Adja meg a sor konvergenciatartományát!
 b) Adjon meg egy olyan intervallumot, ahol a sor egyenletesen konvergens!
 c) Adja meg a $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(k+3)(x+1)^{2k}}{4^{k-1}}$ sor konvergenciatartományát!

2.3.7.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{n^2} x^n$$

- a) Adja meg a sor konvergencia tartományát!
 Adjon meg egy olyan $[\alpha, \beta]$ intervallumot, ahol alkalmazható a tagonkénti integrálásról szóló tétel! Ezt a tételt is írja le!
 b) Hol konvergens a $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{n^2} (x+3)^n$, illetve a $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{n^2} x^{3n}$ sor?

2.3.8.

- a) Határozza meg a

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k k x^k$$

hatványsor konvergenciasugarát és az összegfüggvényét!
 Jelöljük $T(x)$ -szel az összegfüggvényt!

- b) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k k \cdot 2^k}{3^{k+1}} = ?$
 c) $T^{(10)}(x)|_{x=0} = ?$

2.4.

2.4.1.

Definiálja az x_0 bázispontú Taylor sort!

Írja fel a Lagrange-féle hibatagot! Mi a kapcsolata az f függvénnyel és a Taylor sorral?
 Adjon elégséges feltételt az $f(x) = T(x)$ egyenlőségre!

2.4.2.

- a) Hogyan definiáljuk egy f függvény x_0 körüli Taylor sorát?
 b) Milyen alakú lehet a konvergencia tartománya?
 c) Milyen elégséges tételt tanultunk arra, hogy f megegyezzen Taylor sorával?

d) Határozza meg az $f(x) = \sin x$ Taylor sorát $x_0 = 0$ esetén, és igazolja, hogy $f(x)$ megegyezik a Taylor sorával!

2.4.3.

A Taylor sor definíciójával határozza meg az

$$f(x) = \operatorname{sh} x$$

függvény $x_0 = 0$ körüli Taylor sorát!

2.4.4.

Írja fel az $f(x) = e^{2x}$ függvény $x_0 = 0$, illetve $x_0 = 1$ bázispontú Taylor sorát!

2.4.5.

Határozza meg

$$f(x) = \frac{1}{1 + 8x^3}$$

függvény $x_0 = 0$ körüli Taylor sorát és annak konvergenciasugarát!

2.4.6.

Írja fel az $f(x) = \frac{2}{8-x}$ függvény $x_0 = 0$ pontra támaszkodó Taylor sorát és adja meg annak konvergencia tartományát!

2.4.7.

Adja meg az alábbi függvények $x_0 = 0$ bázispontú Taylor sorát és annak konvergenciatartományát!

$$f(x) = \frac{1}{1 + 9x^2} \qquad g(x) = \operatorname{ch} 2x$$

2.4.8.

Írja fel az alábbi függvények $x_0 = 0$ körüli Taylor sorát és határozza meg annak konvergencia tartományát!

a) $f(x) = e^{2-x^2}$

b) $g(x) = \frac{1}{x+4}$

2.4.9.

Írja fel az alábbi függvények $x_0 = 1$ körüli Taylor sorát és annak konvergencia tartományát:

$$f(x) = \frac{1}{4-x} \qquad g(x) = e^{x-1}$$

2.4.10.

Írja fel az alábbi függvények $x_0 = 2$ körüli Taylor sorát és annak konvergenciatartományát!

$$f(x) = \frac{1}{5-x} \qquad g(x) = \sin(x-2)$$

2.4.11.

Fejtse Taylor sorba az alábbi függvényeket, és adja meg a sorok konvergenciatartományát!

a) $f(x) = \frac{1}{x-5}, \quad x_0 = 3$

b) $g(x) = e^{3x}, \quad x_0 = -1$

2.4.12.

A tanult módszerrel írja fel az

$$f(x) = \operatorname{arctg} x$$

függvény $x_0 = 0$ bázispontú Taylor sorát! Ennek felhasználásával adja meg a

$$g(x) = \operatorname{arctg} 5x^2$$

függvény Taylor sorát és annak konvergencia sugarát!

2.4.13.

a) Határozza meg az alábbi függvények $x_0 = 0$ körüli Taylor sorait, azok konvergencia sugarait:

$$f(x) = \frac{1}{1+x^2}, \quad g_1(x) = \operatorname{arctg} x, \quad h_1(x) = \operatorname{arctg} x - x$$

$$g_2(x) = \operatorname{arctg}(3x), \quad h_2(x) = \operatorname{arctg}(3x) - 3x$$

b) Az a) alapján határozza meg a

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{arctg} x - x}{\operatorname{arctg}(3x) - 3x}$$

határértéket.

2.4.14.

a) Írja fel az $f(x) = \operatorname{ch} 2x$ és a $g(x) = \cos 2x$ $x_0 = 0$ körüli Taylor sorait!

b) Adja meg $A \neq 0, \alpha \neq 0$ értékét úgy, hogy

$$\operatorname{ch} \frac{2}{\sqrt{n}} - \cos \frac{2}{\sqrt{n}} \sim An^\alpha.$$

c) Bizonyítsa be, hogy a

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\operatorname{ch} \frac{2}{\sqrt{n}} - \cos \frac{2}{\sqrt{n}} \right) \frac{\cos nx}{n}, \quad x \in \mathbb{R}$$

egyenletesen konvergens!

2.5.

2.5.1.

Írja fel az

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt[5]{1+2x^2}}$$

függvény $x_0 = 0$ bázispontú Taylor sorát és határozza meg konvergencia sugarát!

Írja fel x^4 együtthatóját!

2.5.2.

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt[6]{1+4x^3}}$$

Adja meg a függvény $x_0 = 0$ körüli Taylor sorának konvergenciasugarát valamint 9-edfokú Taylor polinomját!

2.5.3.

Írja fel az alábbi f , g és g' függvények $x_0 = 0$ körüli ötödik Taylor polinomjait és a megfelelő Taylor sorok konvergencia sugarait:

$$f(x) = \sqrt[7]{1+x}, \quad g(x) = \sqrt[7]{1+2x^2}, \quad g'(x) = \frac{d}{dx} \sqrt[7]{1+2x^2}.$$

2.5.4.

$$f(x) = \sqrt[9]{1+3x^2}$$

Adja meg az f függvény $x_0 = 0$ bázispontú Taylor sorát és annak konvergencia sugarát!
 $f^{IV}(0) = ?$ (A sorfejtésből adjon választ!)

2.5.5.

Írja fel az alábbi függvények $x_0 = 0$ körüli Taylor sorait (annak első négy nem nulla tagját) valamint az egyes Taylor sorok konvergenciasugarát!

$$f(x) = \sqrt[7]{(1+x)^2}, \quad g(x) = \sqrt[7]{(1+3x^2)^2}$$

(A Taylor sor együtthatóit szorzatalakban is megadhatja.)

2.5.6.

Adja meg az

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{8+24x^2}}$$

függvény $x_0 = 0$ bázispontú Taylor sorát és annak konvergenciasugarát!

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \text{ jelölés mellett } a_6 = ?$$

2.5.7.

$$f(x) = \sqrt[4]{16 + 3x^4} \quad f^{(11)}(0) = ?, \quad f^{(12)}(0) = ?, \quad R = ?$$

(A deriváltakat szorzatalakban adja meg!)

3. Többváltozós függvények

3.1.

3.1.1.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2x + 3y}{4x + 15y} = ?$$

3.1.2.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + 2y^4}{2x^2 + 3y^2} = ?$$

3.1.3.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy + x^2}{2x^2 + 3y^2} = ?$$

3.1.4.

Legyen

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{3xy}{x^2 + 2y^2}, & \text{ha } x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & \text{ha } x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

a) Keresse meg az $y = mx$ egyenesek mentén a függvény határértékét az origóban!

b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = ?$

3.1.5.

$$f(x, y) = \frac{2x^2 - 3y^2}{x^2 + 5y^2} \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = ?$$

3.2.

3.2.1.

$$f(x, y) = \begin{cases} 2x + \frac{x \cdot \sin y}{x^2 + y^2}, & \text{ha } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & \text{ha } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- Határozza meg f határértékét az origóban az $y = mx$ egyenesek mentén!
Folytonos-e f az origóban?
- Adja meg f'_x -et, ahol az létezik!

3.2.2.

Írja fel az

$$f(x, y) = \frac{(x^2 + 1)y}{e^{2y}}$$

függvény összes másodrendű parciális deriváltját!

3.2.3.

Forgassa meg az (x, z) sík $z = \operatorname{ch} x$ görbét a z tengely körül. Adja meg a kapott forgásfelületet egy kétváltozós függvény grafikonjaként! Mennyi ennek a függvénynek az x szerinti parciális deriváltja az $x_0 = 1$, $y_0 = 0$ pontban?

3.2.4.

- Mikor mondjuk, hogy f totálisan differenciálható az (x_0, y_0) -ban?
- Milyen elégséges feltétel adható f totális differenciálhatóságára?
- Milyen kapcsolat van f totális differenciálhatósága és folytonossága között? (Állítását bizonyítsa be, ill. adjon ellenpéldát!)

3.2.5.

Legyen $f(x, y) = \frac{x + 2y}{x - 2y}$; $f(0, 0) = 0$.

- $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = ?$
- Totálisan differenciálható-e f az origóban?

3.2.6.

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{3x^2 + 4y^2}{2x^2 + y^2}, & \text{ha } (x, y) \neq (0, 0) \\ \frac{7}{3}, & \text{ha } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- a) Folytonos-e a függvény az origóban?
 b) $\text{grad } f|_{(1,0)} = ?$

3.3.

3.3.1.

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{(y+1)x^2}{x^2 + 2y^2}, & \text{ha } (x, y) \neq (0, 0) \\ 1, & \text{ha } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- a) Folytonos-e a függvény az origóban? Totálisan deriválható-e a függvény az origóban?
 b) Adja meg $f'_x(x, y)$ -t, ahol létezik!
 c) Adja meg az iránymenti derivált definícióját! Adjon elégséges feltételt a kiszámítására!

3.3.2.

Határozza meg az

$$f(x, y) = \frac{(y^2 + 1)(x + 1)}{e^{2x}}$$

függvény érintősíkjának az egyenletét az $x_0 = 0$, $y_0 = 1$ -hez tartozó pontban!

3.3.3.

Legyen

$$f(x, y) = \frac{e^{x+3y}}{x}$$

- a) Határozza meg az f függvény gradiensét az $x_0 = 1$, $y_0 = 0$ koordinátájú pontban!
 b) Írja fel az f függvény P pontbeli érintősíkjának az egyenletét!

3.3.4.

$$f(x, y) = xy^2 - \frac{y}{(x+1)^2}$$

- a) $\text{grad } f|_{(1,2)} = ?$
 b) Írja fel az $(1, 2)$ ponthoz tartozó felületi pontban az érintősík egyenletét!

3.3.5.

$$f(x, y) = xy^2 - \frac{y}{(x+1)^2}$$

Írja fel az $(1, 2)$ ponthoz tartozó felületi pontban az érintősík egyenletét!

3.3.6.

$$f(x, y) = \operatorname{arctg} \frac{y}{x}$$

- a) Írja fel a $P_0(1, 1)$ pontbeli érintősík egyenletét!
 b) Határozza meg az $x > 0$ félsík azon pontjait, amelyekben $f''_{xx} + f''_{yy} = 0$.

3.3.7.

$$f(x, y) = xy^2 - \frac{y}{(x+1)^2}$$

- a) $\operatorname{grad} f|_{(1,2)} = ?$
 b) Írja fel az $(1, 2)$ ponthoz tartozó felületi pontban az érintősík egyenletét!

3.3.8.

$$f(x, y) = xy^2 e^{2x}$$

$$f'_x = ? \quad f'_y = ?$$

Írja fel a $P_0(1, -1)$ pontbeli érintősík egyenletét!

3.3.9.

Legyen

$$f(x, y, z) = x^2 y z + x y^2 z^2 + x^3 z^3$$

- a) Írja fel az f függvény $P_0(1, 2, -1)$ pontbeli gradiensét!
 b) Határozza meg az f függvény $P_0(1, 2, -1)$ pontbeli $\underline{v} = 2 \underline{i} - 3 \underline{j} + 5 \underline{k}$ irányú iránymenti deriváltját!

3.3.10.

$$f(x, y, z) = (2x + 1) e^{3z} + \ln 2y \quad P_0 = (1, 1, 0)$$

- a) $\text{grad } f|_{P_0} = ?$
 b) $\left. \frac{df}{d\underline{e}} \right|_{P_0} = ? \quad \underline{e} \parallel (3\underline{i} - 4\underline{k})$

3.3.11.

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2x^3 + y^3}{x^2 + y^2}, & \text{ha } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & \text{ha } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- a) Folytonos-e a függvény az origóban?
 b) Az iránymenti derivált definíciójával vizsgálja meg, hogy létezik-e az iránymenti derivált az origóban, ha $\underline{e} \parallel 3\underline{i} - 4\underline{j}$!

3.3.12.

Legyen

$$f(x, y) = xy + y^2 + 3x^2 - 6x + 7y, \quad P_0(0, 0), \quad \underline{e} \parallel 2\underline{i} - \underline{j}$$

- a) Indokolja meg, hogy f totálisan differenciálható! $\left. \frac{\partial f}{\partial \underline{e}} \right|_{P_0} = ?$
 b) Írja le a kétváltozós függvény iránymenti deriváltjának definícióját, és számolja ki ennek alapján is a $\left. \frac{\partial f}{\partial \underline{e}} \right|_{P_0}$ értékét!

3.3.13.

$$f(x, y) = \frac{e^{2y-1}}{x^2 + 1}$$

- a) Hol létezik $\text{grad } f$? Ahol létezik, írja fel!
 b) $\left. \frac{df}{d\underline{e}} \right|_{P_0} = ? \quad P_0(-1, \frac{1}{2}), \quad \underline{e} \parallel 3\underline{i} - 4\underline{j}$

3.3.14.

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2x^2y}{x^2 + y^2}, & \text{ha } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & \text{ha } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- a) Folytonos-e f az origóban?
 b) Írja fel f'_x -et, ahol az létezik!
 c) $\left. \frac{df}{d\underline{e}} \right|_{(0,0)}$, ha $\underline{e} \parallel \underline{i} - \underline{j}$ (A definícióval dolgozzon!)

3.3.15.

$$f(x, y) = \frac{5x - 3y}{2x + 4y} \quad (x_0, y_0) = (0, 1)$$

- a) $\text{grad } f(x_0, y_0) = ?$, $df((x_0, y_0), (h, k)) = ?$
 b) Milyen irányban lesz az (x_0, y_0) pontban az iránymenti derivált maximális? Adja meg ezt a maximális értéket is!

3.3.16.

$$f(x, y) = x^{2y}$$

Adja meg a $P_0(2, 1)$ pontban a maximális iránymenti derivált irányát és értékét!

3.3.17.

$$f(x, y) = \sqrt{x^2 + 3y^4}$$

- a) $f'_x(0, 0) = ?$; $f'_y(0, 0) = ?$ (A definícióval dolgozzon!)
 b) $\text{grad } f|_{(1,2)} = ?$
 c) Adja meg $\max \frac{df}{d\mathbf{e}} \Big|_{(1,2)}$ értékét és irányát!

3.4.**3.4.1.**

$$f(x, y) = e^{y^2} \cos \pi x \quad P_0 = (x_0, y_0) = (-1, 1)$$

- a) $df((x_0, y_0), (h, k)) = ?$ $d^2f((x_0, y_0), (h, k)) = ?$
 b) Írja fel a P_0 pontbeli érintősík egyenletét!

3.4.2.

$$f(x, y) = h(xy + x^2) \quad h \in C_{\mathbb{R}}^2$$

$$f'_x = ?; \quad f''_{xy} = ?$$

3.4.3.

$$h(x, y) = f(xy^2), \quad f \in C_{\mathbb{R}}^2$$

$$h'_x = ? \quad h''_{xy} = ?$$

3.5.

3.5.1.

Van-e lokális szélsőértéke az

$$f(x, y) = \frac{x^3}{3} + x^2y + 3xy^2 + y^3$$

függvénynek az $x = 0$, $y = \frac{1}{2}$ pontban?

3.5.2.

Legyen

$$f(x, y) = xy + x^2 - x + y - 2$$

Van-e az f -nek lokális szélsőértéke?

3.5.3.

$$f(x, y) = (x + 5)(y + x - 1)$$

a) Hol teljesül a lokális szélsőérték létezésének szükséges feltétele?

b) Van-e f -nek lokális szélsőértéke?

3.5.4.

$$f(x, y) = y^5 - 80y + 12x^3 - x$$

Hol van lokális szélsőértéke a függvénynek?

3.5.5.

Határozza meg az

$$f(x, y) = 2x + y + \frac{4}{xy}$$

függvény lokális maximum ill. minimum helyeit, amennyiben vannak egyáltalán!

3.5.6.

$$f(x, y) = x^3 - 12x + 3 + 2y^2 - y$$

Keresse meg a lokális szélsőérték helyeket!

3.5.7.

Legyen

$$f(x, y) = (x - y + 1)^2 - (x^2 - 2)^2$$

Keresse meg az f függvény lokális szélsőértékeit!

3.5.8.

- a) Fogalmazza meg a kétváltozós függvényekre vonatkozó Weierstrass tételeket!
b) Legyen $f(x, y) = (3y + 6x - 4)^2 + 9(x + y)^2$, és T az $x \geq 0$, $y \geq 0$, $y + x \leq \frac{1}{3}$ egyenlőtlenségekkel adott tartomány! Indokolja meg, hogy f -nek a T tartományon létezik az abszolút maximuma és minimuma, és határozza meg azokat!

3.5.9.

$$f(x, y) = x^2 - 6x + 1 + \frac{y^3}{3} - 3y$$

- a) Határozza meg a függvény lokális szélsőértékeit!
b) Létezik-e $\min_{(x,y) \in T} \{f(x, y)\}$ ill. $\max_{(x,y) \in T} \{f(x, y)\}$, ha $T : y \leq x$, $y \geq 0$, $x \leq 5$?
Ha igen, határozza meg!

3.5.10.

Legyen

$$f(x, y) = (y + 2x - 4)^2 + (y + x)^2$$

és tekintsük a $0 \leq x$, $0 \leq y$ és az $y + x \leq 1$ egyenlőtlenségekkel adott T tartományt! Van-e az f függvénynek a T tartományon abszolút maximuma illetve minimuma? Ha igen, akkor határozza meg!

3.6.

3.6.1.

$$\iint_T (2x - y) dT = ?,$$

ha T az $A(0, 0)$, $B(5, 0)$ és a $C(4, 2)$ pontok által meghatározott háromszög?

3.6.2.

a) Cserélje meg az integrálás sorrendjét!

$$\int_0^1 \int_x^{2-x} f(x, y) dy dx$$

b) $\iint_T (x^2 + y^2 - 1)^2 dT = ?$, ha $T : x^2 + y^2 \leq 4, y \geq 0$

3.6.3.

a) Adja meg a Descartes-féle koordinátáknak a polárkoordinátáktól való függését! Vezesse le a Jacobi determináns értékét! (Mit értünk Jacobi determinánson?)

Hogyan kell végrehajtani a polárkoordinátás helyettesítést a

$$\iint_A f(x, y) dx dy$$

integrálon?

b)

$$\iint_T \frac{1}{(x^2 + y^2)(\ln \sqrt{x^2 + y^2})^2} dT = ? \quad T : x^2 + y^2 \geq e^2, x \geq 0, y \geq 0$$

3.6.4.

$$\iint_T y dT = ?, \quad \text{ha } T : x^2 - 4x + y^2 \leq 0; y \geq x$$

3.6.5.

$$\iint_T \frac{1}{(x^2 + y^2) \ln^3(\sqrt{x^2 + y^2})} dx dy = ?$$

$$T : x^2 + y^2 \leq \frac{1}{e^2}, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0$$

3.6.6.

$$\iint_T \sqrt{x^2 + y^2} dx dy = ?$$

$$T : x^2 + y^2 - 4x \leq 0, \quad y \geq 0$$

3.6.7.

a) $\iint_T (x + 2y) dx dy = ?$ $T : \left\{ \begin{array}{l} |x| + |y| \leq 1 \\ x \geq 0 \end{array} \right\}$

b) Végezze el az $x + 2y = u$, $x = v$ helyettesítést a fenti integrálban!

3.7.

3.7.1.

Mit nevezünk hengerkoordinátáknak? Határozza meg a hengerkoordinátákra való áttérés Jacobi determinánsát! (Mit nevezünk Jacobi determinánsnak?)

3.7.2.

- a) Írja fel az $f(x, y)$ függvény alsó integrálközelítő összegét! Adja meg a jelölések tartalmát!
 b) Adja meg a hengerkoordináták jelentését, és ismertesse a hengerkoordinátás transzformációt! Vezesse le a Jacobi determináns értékét!
 c) $\iiint_V z^2 dV = ?$ $V : \begin{array}{l} 0 \leq z \leq 16 - x^2 - y^2 \\ x^2 + y^2 \leq 4; y \geq 0 \end{array}$

3.7.3.

- a) Határozza meg a polártranszformáció Jacobi determinánsát!
 b) $\iiint_V x^2 + y^2 dV = ?$,
 ha V a $z = x^2 + y^2 - 4$ és a $z = 5 - 3(x^2 + y^2)$ felületek által határolt korlátos térrész.

3.7.4.

$$\iiint_V x^2 dx dy dz = ?$$

$$V : \quad 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4 \quad , \quad 0 \leq z \leq 9 - x^2 - y^2$$

3.7.5.

Számítsa ki az

$z = 12 - (x^2 + y^2)$ és a $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ felületek által határolt korlátos térrész térfogatát!

3.7.6.

$$\iiint_V x^2 + y^2 \, dV = ? \quad V : \text{tetszőleges 2 magasságú, } z \text{ tenghelyű henger}$$

3.7.7.

$$\iiint_V z \, dV = ? \quad V : \quad 0 \leq z \leq 4 - x^2 - y^2, \quad x^2 + y^2 \leq 1$$

3.7.8.

$$\iiint_V x^2 \, dV = ? \quad V : \quad \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 4, \quad y \geq 0$$

3.7.9.

- Mit nevezünk gömbi koordinátáknak? (Mi az egyes koordináták jelentése?)
- Határozza meg a gömbi koordinátákra való áttérés Jacobi determinánsát!
-

$$\iiint_{\mathbb{R}^3} \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} \, dx \, dy \, dz = ? \quad (\text{gömbi koordinátákkal})$$

II. rész

Megoldás

1. Differenciálegyenletek

1.1.

1.1.1.

$$y = -\frac{1}{\sqrt{\frac{2}{3}\cos 3x + 1}}$$

1.1.3.

$$y = \operatorname{arsh}(Ce^{\operatorname{ch}x}); \quad C \in \mathbb{R}$$

1.1.4.

$$y = \frac{1}{3} \left(2 + C(2x+1)^{\frac{3}{2}} \right), \quad C \in \mathbb{R}$$

1.1.5.

$$-\frac{1}{3(y+1)^3} = -\frac{1}{x} + C, \quad \text{illetve } y \equiv -1 \quad (x > 0 \text{ vagy } x < 0)$$

1.1.6.

$$y = -2 + \frac{1}{-\operatorname{arctg}x + C}, \quad \text{illetve } y \equiv -2$$
$$y(1) = -1 : \quad y = -2 + \frac{1}{-\operatorname{arctg}x - 1 - \frac{\pi}{4}}$$

1.1.7.

$$y = \ln(Ce^x + e), \quad \text{illetve } y \equiv 1$$
$$y(0) = 1 : \quad y \equiv 1; \quad y(0) = 2 : \quad y = \ln((e^2 - e)e^x + e)$$

1.1.9.

$$y^2 - 2y + 3 = Ke^{-\frac{1}{(x+1)^2}} \quad K > 0 \quad \text{és} \quad y \neq 1, \quad x \neq -1$$

Részletezve:

$$y = 1 + \sqrt{Ke^{-\frac{1}{(x+1)^2}} - 2}, \quad y > 1 \quad \text{és} \quad (x > -1 \text{ vagy } x < -1)$$

$$y = 1 - \sqrt{Ke^{-\frac{1}{(x+1)^2}} - 2}, \quad y < 1 \quad \text{és} \quad (x > -1 \text{ vagy } x < -1)$$

1.1.10.

$$y^2 - 6y + 8 = C(x+5) \quad \text{és} \quad y \neq 3, \quad x \neq -5$$

Részletezve:

$$y = 3 + \sqrt{1 + C(x+5)}, \quad y > 3 \text{ és } (x > -5 \text{ vagy } x < -5)$$

$$y = 3 - \sqrt{1 + C(x+5)}, \quad y < 3 \text{ és } (x > -5 \text{ vagy } x < -5),$$

$$\text{illetve } y \equiv 2, \text{ de } x > -5 \text{ vagy } x < -5$$

$$\text{illetve } y \equiv 4, \text{ de } x > -5 \text{ vagy } x < -5$$

$$\text{a) } y \equiv 2, x > -5$$

$$\text{b) } y = 3 - \sqrt{1 + \frac{3}{5}(x+5)}, \quad x > -5$$

1.2.

1.2.2.

$$\text{a) } y = Cx^2 \quad C \in \mathbb{R}, \quad x \neq 0$$

$$\text{b) } y = Cx^2 + \frac{x^4}{2} \quad C \in \mathbb{R}, \quad x \neq 0$$

1.2.3.

$$y = Cx + x \ln \sqrt{1+x^2}$$

1.2.4.

$$y = -\frac{1}{2} + Ce^{2x^2} \quad C \in \mathbb{R}$$

1.2.5.

$$y = \frac{C}{x^3} + x^2 - x, \quad x \neq 0$$

1.2.6.

$$y = Ce^{x^2} + \frac{x^4}{4} e^{x^2}$$

1.2.7.

$$y = Cx^4 - \frac{1}{2} e^{-2x} x^4, \quad x \neq 0$$

1.2.8.

$$y = C(e^x + 5) - \frac{e^x + 5}{e^x}$$

1.3.

1.3.1.

$$u'x = u^2 - 2u + 1 \quad \implies \quad \frac{y}{x} - 1 = \frac{1}{-\ln x + C} \quad (x > 0)$$

1.3.2.

$$u' = u^2 \implies -\frac{1}{y+2x} = x + C, \quad \text{illetve} \quad y = -2x$$

$$y(1) = -3 : \quad y = -\frac{1}{x} - 2x, \quad x > 0$$

1.3.4.

$$y = \sqrt[3]{Ce^{2x} - 1 + e^{3x}}$$

1.3.5.

$$u' - \frac{u}{x} = x^3 \quad \text{elsőrendű lineáris inhomogén differenciálegyenlet} \quad (x \neq 0)$$

1.3.6.

$$y = e^{2x}$$

1.4.**1.4.2.**

a) Pl. $|x-2| \leq 1; |y-5| \leq 1$ (zárt) téglalapon f és $f'_y = \frac{-1}{(y-x)^2}$ folytonos
 $\implies \exists$ az $x_0 = 2$ pontnak egy olyan környezete, melyben az adott kezdeti érték problémájának pontosan egy megoldása van.

b) $y'(2) = (f(2, 5))' = \frac{4}{3}$: a vonalelem meredeksége. Tehát az $\frac{y-x+1}{y-x} = \frac{4}{3}$ feltételnek eleget tevő pontokban ugyanilyen irányú az iránymező.

$$c) T_2(x) = 5 + \frac{4}{3}(x-2) + \frac{-1}{2!}(x-2)^2$$

1.4.4.

$$a) y'(1) = f(1, 2) = 1 = m$$

$$\text{Az izoklina: } x^2 + y^2 - 2xy = 1 \implies y = x \pm 1$$

b) Szükséges feltétel:

$$y' = 0 = (y-x)^2 \implies y = x \text{ pontjaiban lehet lokális szélsőérték.}$$

$$y'' = \dots = 2x - 2y + 2y'(y-x) \implies \text{az } y = x \text{ egyenes pontjaiban } y'' = 0 \text{ és}$$

$$y''' = 2 \implies y = x \text{ pontjaiban nincs lokális szélsőérték.}$$

$$\text{Jobb megoldás: } y' = (y-x)^2 \geq 0 \implies \text{nincs lokális szélsőérték}$$

1.5.**1.5.1.**

$$a) y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{3x}; \quad y = -e^{-x} + e^{3x}$$

$$b) y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{3x} - x + \frac{2}{3}$$

$$c) y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{3x} + \sin x + \cos x$$

1.5.2.

$$y = C_1 e^{-3x} + C_2 e^x + \frac{1}{32} e^{5x}$$

1.5.3.

$$y = C_1 e^{3x} + C_2 x e^{3x} + 3x^2 + 4x + 2$$

1.5.4.

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{-2x} + 2x e^x - x - \frac{1}{2}$$

1.5.5.

$$y = C_1 + C_2 e^{-8x} - \frac{1}{2} \sin 2x - 2 \cos 2x$$

1.5.6.

$$y = C_1 e^{-5x} \cos 2x + C_2 e^{-5x} \sin 2x - \frac{1}{29} e^{29x}$$

1.5.10.

$$y = C_1 + C_2 \cos 3x + C_3 \sin 3x + \frac{1}{9} x^3 - \frac{2}{27} x$$

1.5.11.

$$y = C_1 + C_2 \cos 2x + C_3 \sin 2x + 2x^3 - 3x$$

1.6.

1.6.2.

$$x e^{3y^2} + x^2 + 2x + x^2 y^3 + 3y^3 = C$$

$$y(1) = 0 : x e^{3y^2} + x^2 + 2x + x^2 y^3 + 3y^3 = 4$$

1.6.5.

$$y e^{y^2+2x} + 3x^2 + 3y = C$$

1.6.6.

$$x^2 e^{2y} + 3x^2 + \sin xy - 6y = C$$

$$y(1) = 0 : x^2 e^{2y} + 3x^2 + \sin xy - 6y = 4$$

1.6.7.

$$e^{2x+y} + \frac{x^2}{2} + y^3 = C$$

$$y(0) = 1 : e^{2x+y} + \frac{x^2}{2} + y^3 = e + 1$$

1.6.10.

a) $\frac{\mu'(x - y^2)}{\mu(x - y^2)} = \frac{h'_x - g'_y}{-2y \cdot g - h} = f(x - y^2)$ -nek kell teljesülnie

b) $\mu(x - y^2) = x - y^2$

1.7.

1.7.1.

$$\lambda_1 = 2, \underline{s}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad \lambda_2 = -1, \underline{s}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \lambda_3 = 1, \underline{s}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_1 = -1, \underline{s}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \lambda_2 = \lambda_3 = 1, \underline{s}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \underline{s}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

1.7.3.

$$\lambda_1 = 2, \underline{s}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \lambda_2 = 2 + i, \underline{s}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 + i \end{pmatrix}, \quad \lambda_3 = 2 - i, \underline{s}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 + i \end{pmatrix}$$

1.7.4.

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0, \underline{s}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \lambda_4 = 1, \underline{s}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

2. Függvénysorozatok, függvénysorok

2.1.

2.1.1.

$$f(x) = 3x, \quad x \in \mathbb{R}$$

2.1.2.

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{x^2}{n^3} - x}{\frac{x^4}{n^3} + 1 + \frac{3}{n^3}} = -x, \quad D_f = \mathbb{R}$$

2.1.3.

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^3}}{x + (x+2)\frac{1}{n} + \frac{1}{n^3}} = 1, \quad \text{ha } x > 0$$

$$f(0) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 1}{2n^2 + 1} = \frac{1}{2}$$

$$\text{Tehát } f(x) = \begin{cases} 1, & \text{ha } x > 0 \\ \frac{1}{2}, & \text{ha } x = 0 \end{cases}$$

2.1.4.

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \begin{cases} \frac{x}{2}, & \text{ha } x > 0 \\ \frac{1}{5}, & \text{ha } x = 0 \end{cases}$$

Nem egyenletes a konvergencia, mert a határfüggvény nem folytonos.
(Az f_n függvények folytonosak.)

2.1.6.

$$\text{a) } f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{\sin nx}{n} \right) = 1; \quad D_f = \mathbb{R}$$

$$\text{b) } \|f_n - f\| = \sup_{x \in \mathbb{R}} \frac{|\sin nx|}{n} = \frac{1}{n}$$

2.1.7.

$$\text{a) } f(x) \equiv 0, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\text{b) } \|f_n - f\| = \sup_{x \in \mathbb{R}} \frac{1}{x^2 + n^4} = \frac{1}{n^4}$$

2.1.8.

$$\text{a) } f(x) \equiv 0$$

$$\text{b) } \|f - f_n\| = \dots = f_n\left(\frac{n}{2}\right) = \frac{1}{4n} \rightarrow 0, \quad \text{egyenletes a konvergencia.}$$

2.1.9.

- a) $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{-x^2}{n} + \left(1 + \frac{4}{n}\right)x \right) = x$
- b) $\|f_n - f\| = \sup_{x \in [0,3]} \frac{-x^2 + 4x}{n} = \frac{-x^2 + 4x}{n} \Big|_{x=2} = \frac{4}{n}$
- c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4}{n} = 0 \implies$ egyenletes a konv.

2.1.10.

- a) $f(x) = \frac{1}{x+1}$
- b) $\|f_n - f\| = \frac{\sqrt[n]{n} - 1}{\sqrt[n]{n}}$
- c) $\|f_n - f\| \rightarrow 0$, egyenletes a konvergencia.

2.1.12.

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{ha } x = 0 \\ 2x^2, & \text{ha } x > 0 \end{cases} \quad \left(\left(\frac{1}{e^{x^2}} \right)^n \rightarrow 0, \text{ ha } x \neq 0 \right)$$

$[0, 1]$ -en nem egyenletes a konvergencia, mert f_n -ek folytonosak, de f nem.

$[1, 2]$ -ön: $\|f_n - f\| = \sup_{x \in [1,2]} \left| 2x^2 + \left(\frac{1}{e^{x^2}} \right)^n - 2x^2 \right| = \left(\frac{1}{e} \right)^n \rightarrow 0$, tehát egyenletes a konvergencia.

2.1.13.

- a) $f(x) = e^{2x}$, $x \in \mathbb{R}$
- b) $\|f_n - f\| = \sup_{x \in \mathbb{R}} \frac{\sin^2(n^3 x^2)}{\sqrt{2n^2 + 3}} = \frac{1}{\sqrt{2n^2 + 3}} \rightarrow 0$

a konvergencia egyenletes és az f_n függvények folytonosak

$$\implies \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx = \int_0^1 \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx = \int_0^1 e^{2x} dx = \frac{1}{2}(e^2 - 1)$$

2.2.

2.2.1.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (2e^x)^n = \frac{2e^x}{1 - 2e^x} \quad (\text{geom. sor}), \quad \text{ha } |2e^x| < 1, \text{ vagyis } x \in (-\infty, -\ln 2)$$

2.2.2.

$$s(x) = 2 \frac{(\ln x)^2}{1 - \ln x}, \quad \text{ha } -1 < \ln x < 1, \text{ vagyis } \frac{1}{e} < x < e$$

2.2.3.

$|f_k(x)| < \frac{1}{k^2}$, $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ konvergens $\implies \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ egyenletesen konvergens $x \in \mathbb{R}$ -en.
(Weierstrass kritérium.)

2.2.4.

$|f_k(x)| \leq \frac{1}{3^k}$, $x \in \mathbb{R}$ és $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{3^k}$ konvergens (geometriai sor)
 $\implies \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ egyenletesen konvergens \mathbb{R} -en.

2.2.6.

$\sum_{k=0}^{\infty} f_k(x)$:

$|f_k(x)| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^k$, $\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^k$ konvergens $\implies \sum_{k=0}^{\infty} f_k(x)$ egyenletesen konvergens a $[0, \pi]$ intervallumon (\mathbb{R} -en is) és az f_k függvények folytonosak.

Az előzőek miatt a \sum és az integrál jel felcserélhető.

2.2.7.

$|f_n(x)| \leq \left(\frac{1}{3}\right)^n$, $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n$ konv. geom. sor $\implies \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ egyenletesen konv.

$(-\infty, \infty)$ -en, és $f_n \in C_{\mathbb{R}}^0 \implies$ az összegfüggvény mindenütt folytonos és $\forall [a, b]$ -n tagonként integrálható.

2.2.8.

a) $|f_n(x)| < \frac{1}{n^2}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ konvergens $\implies \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ egyenletesen konvergens

$\implies \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ (pontonként) konvergens $x \in \mathbb{R}$ -en

b) $|f'_n(x)| = \frac{\left|\frac{1}{n^2} \sin \frac{x+1}{n^2}\right|}{n^2 + 3n + 8} < \frac{1}{n^4}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$ konvergens $\implies \sum_{n=1}^{\infty} f'_n(x)$ egyenl. konv.

Tehát a feltételek teljesülnek, így $\forall x \in \mathbb{R}$ -re deriválható a sor összegfüggvénye.

2.2.10.

$|f_n(x)| \leq \frac{2}{\sqrt{n^5}}$, $x \in \mathbb{R}$ és $2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{5/2}}$ konv. $\implies \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ egyenl. konv.

$\implies \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ konv. \mathbb{R} -en.

$$\sum_1^{\infty} f'_n(x) = \sum_1^{\infty} \frac{-\sin(n^3 + \sqrt{n}x) \cdot \sqrt{x}}{4\sqrt{n^5} + 3}$$

$$|f'_n(x)| \leq \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n^5}} = \frac{1}{n^2}, \quad x \in \mathbb{R} \quad \text{és} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \text{ konv.} \quad \implies \quad \sum_{n=1}^{\infty} f'_n(x) \text{ egyenl. konv.}$$

A fentiek miatt a sor tagonként deriválható.

2.3.

2.3.1.

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| = \dots = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{(k+1)^2}{(2k+2)(2k+1)} = \frac{1}{4}, \quad R = 4$$

2.3.2.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \dots = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \right)^2 \frac{1 + \frac{1}{n}}{1 + \frac{1}{2n}} = e^2 \quad \implies \quad R = \frac{1}{e^2}$$

2.3.3.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n}}{3} = \frac{1}{3} \quad \implies \quad R = 3$$

$$x = -4: \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ div.}$$

$$x = 2: \quad \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n} \text{ konv.}$$

KT.: $(-4, 2]$

2.3.5.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{(\sqrt[n]{n})^4} = 3 = \frac{1}{R} \quad \implies \quad R = \frac{1}{3}, \text{ a végpontokban is konvergens.}$$

$$\text{Így a konvergencia tartomány: } |x - 4| \leq \frac{1}{3}$$

2.3.6.

a) $(-4, 4)$

b) Pl. $[0, 1]$ ($\forall [\alpha, \beta] \subset (-4, 4)$ -ben egyenletes a konvergencia.)

c) $z = (x+1)^2$ helyettesítéssel a)-ra visszavezethető. Így a konvergencia tartomány: $-4 < (x+1)^2 < 4$ miatt $|x+1| < 2$, vagyis a $(-3, 1)$ intervallum.

2.3.7.

$$\text{a) } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{(\sqrt[n]{n})^2} = 2 = \frac{1}{R} \quad \implies \quad R = \frac{1}{2}, \text{ a végpontokban is konvergens.}$$

$$\text{Így a konvergencia tartomány: } |x| \leq \frac{1}{2}$$

$$\text{Pl. } [\alpha, \beta] = \left[0, \frac{1}{3} \right]$$

A megfelelő tétel: 1. Segédlet!

Megjegyzés:

$\forall [\alpha, \beta] \subset \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ jó (tanult tétel). De most

$$\left| \frac{(-2)^n}{n^2} x^n \right| \leq \frac{1}{n^2}, \quad \text{ha } |x| \leq \frac{1}{2}$$

Így a sor egyenletesen konvergens a $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$ intervallumon is. Ezért $[\alpha, \beta] = \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$ is jó.

$$\begin{aligned} \text{b) } |x+3| &\leq \frac{1}{2} \\ |x^3| &\leq \frac{1}{2} \implies |x| \leq \frac{1}{\sqrt[3]{2}} \end{aligned}$$

2.4.

2.4.4.

$$e^{2x} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2^k x^k}{k!}, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$e^{2x} = e^{2(x-1)+2} = e^2 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2^k (x-1)^k}{k!}, \quad x \in \mathbb{R}$$

2.4.5.

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k 8^k x^{3k}$$

$$\text{Konvergencia tartomány: } |-8x^3| < 1, \quad R = \frac{1}{\sqrt[3]{8}} = \frac{1}{2}$$

2.4.6.

$$f(x) = \frac{2}{8-x} = \frac{1}{4} \frac{1}{1-\frac{x}{8}} = \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{8}\right)^n$$

$$\text{Konvergencia tartomány: } |q| = \left|\frac{x}{8}\right| < 1 \implies |x| < 8$$

2.4.7.

$$f(x) = \frac{1}{1+9x^2} = \frac{1}{1-(-9x^2)} = \sum_{n=0}^{\infty} (-9x^2)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n 9^n x^{2n}$$

$$\text{Konvergencia tartomány: } |q| = |-9x^2| < 1 \implies |x| < \frac{1}{3}$$

$$g(x) = \text{ch } 2x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2x)^{2n}}{(2n)!}, \quad x \in \mathbb{R}$$

2.4.9.

$$f(x) = \frac{1}{3} \frac{1}{1 - \frac{x-1}{3}} = \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x-1}{3}\right)^n \quad \text{KT.: } |x-1| < 3$$

$$g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{n!}, \quad x \in \mathbb{R}$$

2.4.11.

$$f(x) = \frac{1}{x-5} = \frac{1}{(x-3)-2} = -\frac{1}{2} \frac{1}{1 - \frac{x-3}{2}} = -\frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x-3}{2}\right)^n \quad \text{KT.: } |x-3| < 2$$

$$e^{3x} = e^{3(x+1)-3} = e^{-3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(3(x+1))^n}{n!} = e^{-3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{n!} (x+1)^n, \quad x \in \mathbb{R}$$

2.4.12.

$$\arctg x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1} \quad |x| \leq 1 \quad \text{L. Segédlet!}$$

$$\arctg 5x^2 = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} (5x^2)^{2k+1} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k 5^{2k+1}}{2k+1} x^{4k+2}$$

$$\text{K.T.: } |5x^2| \leq 1 \implies R = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

2.5.

2.5.1.

$$f(x) = (1+2x^2)^{-1/5} = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{-1/5}{k} 2^k x^{2k}, \quad R = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$a_4 = \binom{-1/5}{2} 2^2 = \frac{12}{25}$$

2.5.4.

$$\sum_{k=0}^{\infty} \binom{1/9}{k} 3^k x^{2k} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad R = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$f^{IV}(0) = 4! a_4 = 24 \binom{1/9}{2} 3^2 = -\frac{32}{3}$$

2.5.6.

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{8}} \frac{1}{\sqrt[3]{1+3x^2}} = \frac{1}{2} (1+3x^2)^{-1/3} = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} \binom{-1/3}{k} 3^k x^{2k}, \quad R = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

2.5.7.

$$f(x) = \sqrt[4]{16} \sqrt[4]{1 + \frac{3x^4}{16}} = 2 \left(1 + \frac{3}{16} x^4\right)^{1/4} =$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} 2 \binom{1/4}{k} \left(\frac{3}{16}\right)^k x^{4k} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad R = \frac{2}{\sqrt[4]{3}}$$

$$f^{(11)}(0) = 11! a_{11} = 0$$

$$f^{(12)}(0) = 12! a_{12} = 12! 2 \binom{1/4}{3} \left(\frac{3}{16}\right)^3 = 12! 2 \frac{\frac{1}{4}(-\frac{3}{4})(-\frac{7}{4})}{3!} \left(\frac{3}{16}\right)^3$$

3. Többváltozós függvények

3.1.

3.1.1.

Nem létezik, mert pl.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{2x + 3y}{4x + 15y} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{4x} = \frac{1}{2} \neq \frac{1}{5} = \lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x + 3y}{4x + 15y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{3y}{15y}$$

Vagy: $x_n = \varrho_n \cos \varphi_n$; $y_n = \varrho_n \sin \varphi_n$

$$\lim_{\substack{\varrho_n \rightarrow 0 \\ \varphi_n \text{ tetsz.}}} \frac{2\varrho_n \cos \varphi_n + 3\varrho_n \sin \varphi_n}{4\varrho_n \cos \varphi_n + 15\varrho_n \sin \varphi_n} = \frac{2 \cos \varphi_n + 3 \sin \varphi_n}{4 \cos \varphi_n + 15 \sin \varphi_n}$$

függ φ_n -től, pl. $\varphi_n = \frac{\pi}{2}$ esetén: $\frac{1}{5}$; $\varphi_n = \pi$ esetén: $\frac{1}{2}$

3.1.2.

Nem létezik, mert

$$\lim_{\substack{\varrho_n \rightarrow 0 \\ \varphi_n \text{ tetsz.}}} \frac{\varrho_n^2 \cos^2 \varphi_n + 2\varrho_n^4 \sin^4 \varphi_n}{2\varrho_n^2 \cos^2 \varphi_n + 3\varrho_n^2 \sin^2 \varphi_n} = \lim_{\substack{\varrho_n \rightarrow 0 \\ \varphi_n \text{ tetsz.}}} \frac{\cos^2 \varphi_n + 2\varrho_n^2 \sin^4 \varphi_n}{2 + \sin^2 \varphi_n} = \frac{\cos^2 \varphi_n}{2 + \sin^2 \varphi_n}$$

függ φ_n -től, pl. $\varphi_n = \frac{\pi}{2}$ esetén: 0; $\varphi_n = 0$ esetén: $\frac{1}{2}$

3.1.3.

Nem létezik, mert pl. $y = mx$ mentén

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x, mx) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot mx + x^2}{2x^2 + 3m^2x^2} = \frac{m + 1}{2 + 3m^2},$$

azaz függ m -től.

3.1.4.

a) $\frac{3m}{1 + 2m^2}$

b) nem létezik, hiszen függ m -től.

3.1.5.

Nem létezik, mert

$$\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2}{x^2} = 2 \neq -\frac{3}{5} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{-3y^2}{5y^2} = \lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y)$$

3.2.

3.2.1.

a)

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x, mx) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(2x + \frac{x \sin mx}{x^2 + m^2 x^2} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(2x + \frac{\sin mx}{mx} \cdot \frac{mx}{x + m^2 x} \right) = \frac{m}{1 + m^2}$$

függ m -től $\implies \nexists \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) \implies f$ nem folytonos az origóban.

b)

$$f'_x(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2h + 0 - 0}{h} = 2$$

Ha $(x, y) \neq (0, 0)$:

$$f'_x = 2 + \frac{\sin y \cdot (x^2 + y^2) - x \sin y \cdot 2x}{(x^2 + y^2)^2}$$

3.2.2.

$$f'_x = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{y}{e^{2y}} (x^2 + 1) \right) = \frac{y}{e^{2y}} \cdot 2x$$

$$f''_{xx} = \frac{y}{e^{2y}} \cdot 2$$

$$f''_{xy} = 2x \cdot \frac{e^{2y} - y \cdot 2e^{2y}}{(e^{2y})^2}$$

$$f'_y = (x^2 + 1) \frac{e^{2y} - y \cdot 2e^{2y}}{(e^{2y})^2} = (x^2 + 1) \frac{1 - 2y}{e^{2y}}$$

$$f''_{yy} = (x^2 + 1) \frac{-2e^{2y} - (1 - 2y) 2e^{2y}}{(e^{2y})^2}$$

3.2.5.

a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) \nexists$, mert

$$\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{x + 2y}{x - 2y} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x} = 1 \neq f(0, 0)$$

b) Mivel f nem folytonos $(0, 0)$ -ban (hiszen \nexists itt a határérték), így nem differenciálható a $(0, 0)$ -ban.

3.2.6.

a) Nem folytonos a függvény az origóban. Pl. $x = 0$ egyenes mentén:

$$\lim_{y \rightarrow 0} f(0, y) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{4y^2}{y^2} = 4 \neq \frac{7}{3} = f(0, 0)$$

$$\text{b) } f'_x = \frac{6x(2x^2 + y^2) - (3x^2 + 4y^2) \cdot 4x}{(2x^2 + y^2)^2}; \quad f'_x(1, 0) = 0$$

$$f'_y = \frac{8y(2x^2 + y^2) - (3x^2 + 4y^2) \cdot 2y}{(2x^2 + y^2)^2}; \quad f'_y(1, 0) = 0$$

$$\text{grad } f|_{(1,0)} = 0 \underline{i} + 0 \underline{j} = \underline{0} \quad (\exists, \text{ mert } f'_x, f'_y \text{ } K_{(1,0)}\text{-ban } \exists \text{ és folyt.)}$$

3.3.

3.3.1.

a)

$$\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0}{2y^2} = 0 \neq 1 = f(0, 0)$$

$\implies f$ nem folytonos $(0, 0)$ -ban \implies nem deriválható $(0, 0)$ -ban.

b) Ha $(x, y) \neq (0, 0)$:

$$f'_x = \frac{(y+1) \cdot 2x(x^2 + 2y^2) - (y+1)x^2 \cdot 2x}{(x^2 + 2y^2)^2}$$

$$f'_x(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{h^2}{h^2} - 1}{h} = 0$$

3.3.2.

$$f'_x = (y^2 + 1) \frac{1 \cdot e^{2x} - (x+1) 2e^{2x}}{(e^{2x})^2} \quad f'_x(0, 1) = -1$$

$$f'_y = \frac{x+1}{e^{2x}} \cdot 2y \quad f'_y(0, 1) = 2$$

$$f(0, 1) = 2$$

$$\text{Az érintősík: } -1(x-0) + 2(y-1) - (z-2) = 0$$

3.3.3.

$$\text{a) } \text{grad } f|_{(1,0)} = 0 \underline{i} + 3e \underline{j}$$

$$\text{b) } 0 \cdot (x-1) + 3e \cdot (y-0) - (z-e) = 0$$

3.3.5.

$$5(x-1) + \frac{15}{4}(y-2) - (z-\frac{7}{2}) = 0$$

3.3.10.

$$\text{a) } f'_x = 2e^{3z} \quad f'_y = \frac{1}{2y} \cdot 2 \quad f'_z = (2x+1) \cdot 3e^{3z}$$

$$\text{grad } f|_{P_0} = 2\underline{i} + \underline{j} + 9\underline{k} = [2, 1, 9]$$

$$\text{b) } \underline{e} \parallel (3\underline{i} - 4\underline{k}) \implies \underline{e} = \frac{1}{\sqrt{9+0+16}} (3\underline{i} - 4\underline{k}) = [\frac{3}{5}, 0, -\frac{4}{5}]$$

$$\left. \frac{df}{d\underline{e}} \right|_{P_0} = \text{grad } f|_{P_0} \cdot \underline{e} = 2 \cdot \frac{3}{5} + 1 \cdot 0 + 9 \cdot \frac{-4}{5} = -\frac{30}{5} = -6$$

3.3.11.

a) Igen:

$$\lim_{\substack{\varrho_n \rightarrow 0 \\ \varphi_n \text{ tetsz.}}} \frac{2\varrho_n^3 \cos^3 \varphi_n + \varrho_n^3 \sin^3 \varphi_n}{\varrho_n^2} = \lim_{\substack{\varrho_n \rightarrow 0 \\ \varphi_n \text{ tetsz.}}} \varrho_n \underbrace{(2 \cos^3 \varphi_n + \sin^3 \varphi_n)}_{\text{korlátos}} = 0$$

b) Létezik:

$$\left. \frac{df}{d\underline{e}} \right|_{\underline{0}} = \lim_{t \rightarrow +0} \frac{f(\underline{0} + \underline{e}t) - f(\underline{0})}{t} \quad \underline{e} = \frac{3}{5}\underline{i} - \frac{4}{5}\underline{j}$$

$$\begin{aligned} \left. \frac{df}{d\underline{e}} \right|_{\underline{0}} &= \lim_{t \rightarrow +0} \frac{f\left(\frac{3}{5}t, -\frac{4}{5}t\right) - f(0,0)}{t} = \lim_{t \rightarrow +0} \frac{\frac{2\left(\frac{3}{5}\right)^3 t^3 - \left(\frac{4}{5}\right)^3 t^3}{\left(\frac{3}{5}\right)^2 t^2 + \left(\frac{4}{5}\right)^2 t^2} - 0}{t} = \\ &= \lim_{t \rightarrow +0} \left(2 \left(\frac{3}{5}\right)^3 - \left(\frac{4}{5}\right)^3 \right) = 2 \left(\frac{3}{5}\right)^3 - \left(\frac{4}{5}\right)^3 \end{aligned}$$

3.3.16.

$$\max \left. \frac{df}{d\underline{e}} \right|_{(2,1)} = \sqrt{4^2 + (8 \ln 2)^2} \quad \underline{e} = \frac{1}{\sqrt{4^2 + (8 \ln 2)^2}} (4\underline{i} + 8 \ln 2 \underline{j})$$

3.3.17.

$$\begin{aligned} \text{a) } f'_x(0,0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h,0) - f(0,0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{h^2-0}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0 \pm} \frac{|h|}{h} = \pm 1 \neq \\ f'_y(0,0) &= \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(0,k) - f(0,0)}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{\sqrt{3k^4-0}}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{\sqrt{3}k^2}{k} = 0 \end{aligned}$$

b) $K_{(1,2)}$ -ben f parciálisai léteznek és folytonosak

$$\implies \exists \text{grad } f|_{(1,2)} = f'_x(1,2) \underline{i} + f'_y(1,2) \underline{j} = \frac{1}{7} \underline{i} + \frac{48}{7} \underline{j},$$

$$\text{mert } f'_x = \frac{1}{2\sqrt{x^2 + 3y^4}} \cdot 2x; \quad f'_y = \frac{1}{2\sqrt{x^2 + 3y^4}} \cdot 12y^3$$

$$\text{c) } \max \frac{df}{d\underline{e}} \Big|_{(1,2)} = |\text{grad } f|_{(1,2)}| = \sqrt{\left(\frac{1}{7}\right)^2 + \left(\frac{48}{7}\right)^2}, \text{ ha } \underline{e} = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{1}{7}\right)^2 + \left(\frac{48}{7}\right)^2}} \left(\frac{1}{7} \underline{i} + \frac{48}{7} \underline{j}\right)$$

3.4.

3.4.1.

$$\text{a) } f'_x = -\pi e^{y^2} \sin \pi x \quad f'_x(-1, 1) = 0$$

$$f'_y = 2y e^{y^2} \cos \pi x \quad f'_y(-1, 1) = -2e$$

$$df((1, 1), (h, k)) = f'_x(-1, 1) \cdot h + f'_y(-1, 1) \cdot k = -2e k$$

$$f''_{xx} = -\pi^2 e^{y^2} \cos \pi x \quad f''_{xx}(-1, 1) = \pi^2 e$$

$$f''_{xy} = -\pi 2y e^{y^2} \sin \pi x \quad f''_{xy}(-1, 1) = 0$$

$$f''_{yy} = (2e^{y^2} + 2y \cdot 2y e^{y^2}) \cos \pi x \quad f''_{yy}(-1, 1) = -6e$$

$$d^2 f((1, 1), (h, k)) = f''_{xx}(-1, 1) h^2 + 2f''_{xy}(-1, 1) hk + f''_{yy}(-1, 1) k^2 = \pi^2 e h^2 - 6e k^2$$

b) Érintősík:

$$f'_x(-1, 1)(x - (-1)) + f'_y(-1, 1)(y - 1) - (z - f(-1, 1)) = 0$$

$$-2e(y - 1) - (z - (-e)) = 0$$

3.4.2.

$$f'_x = h'(xy + x^2) \cdot (y + 2x)$$

$$f''_{xy} = \frac{\partial}{\partial y} (h'(xy + x^2)) \cdot (y + 2x) + h'(xy + x^2) \frac{\partial}{\partial y} (y + 2x) = \\ = h''(xy + x^2) \cdot x(y + 2x) + h'(xy + x^2) \cdot 1$$

3.5.

3.5.2.

Nincs lokális szélsőértéke.

3.5.6.

$$f'_x = 3x^2 - 12 = 0 \quad x = \pm 2$$

$$f'_y = 4y - 1 = 0 \quad y = \frac{1}{4}$$

$P_1 \left(2, \frac{1}{4}\right)$ ill. $P_2 \left(-2, \frac{1}{4}\right)$ jöhet szóba.

$$D = \begin{vmatrix} f''_{xx} & f''_{xy} \\ f''_{yx} & f''_{yy} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 6x & 0 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} = 24x$$

$$D_{P_1} > 0, \quad f''_{xx}|_{P_1} > 0 \quad \implies \quad \text{lok. min. van } P_1\text{-ben.}$$

$$D_{P_2} < 0 \quad \implies \quad \text{nincs lok. szé. } P_2\text{-ben.}$$

3.5.7.

Lok. min.: $f(0, 1) = -4$

3.5.8.

a) ...

$$b) \quad f'_x = 2(x - y + 1) - 2(x^2 - 2) \cdot 2x = 2 + 10x - 4x^3 - 2y = 0$$

$$f'_y = 2(x - y + 1)(-1) = 0 \quad \implies \quad y = x + 1$$

Ezt behelyettesítve az 1. egyenletbe: $4x(x^2 - 2) = 0$

A szükséges feltétel a következő pontokban teljesül:

$$P_1(0, 1); \quad P_2(\sqrt{2}, 1 + \sqrt{2}); \quad P_3(-\sqrt{2}, 1 - \sqrt{2})$$

$$D(x, y) = \begin{vmatrix} f''_{xx} & f''_{xy} \\ f''_{yx} & f''_{yy} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 10 - 12x^2 & -2 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} = 16 - 24x^2$$

$$D(0, 1) = 16 > 0, \quad f''_{xx}(0, 1) = 18 > 0 \quad \implies \quad \text{lok. min. } f(0, 1) = -4$$

$$D|_{P_2} < 0; \quad D|_{P_3} < 0 \quad \implies \quad P_2\text{-ben és } P_3\text{-ban nincs lokális szélsőérték.}$$

3.5.10.

f folytonos és T kompakt \implies f -nek van minimuma és maximuma T -n (Weierstrass II.).

$$f_{\min} = f(1, 0) = 5; \quad f_{\max} = f(0, 0) = 16$$

3.6.

3.6.3.

a) $x = r \cos \varphi, \quad y = r \sin \varphi$

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \varphi)} = \begin{vmatrix} x'_r & x'_\varphi \\ y'_r & y'_\varphi \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \varphi & -r \sin \varphi \\ \sin \varphi & r \cos \varphi \end{vmatrix} = r$$

$$\iint_A f(x, y) dx dy = \iint_{A^*} f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) \cdot r dr d\varphi$$

$(r, \varphi) \in A^*$ esetén $(x, y) \in A$

b) $I = \lim_{R \rightarrow \infty} I_R, \quad e^2 \leq x^2 + y^2 \leq R^2, \quad e \leq r \leq R, \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$

$$I_R = \int_e^R \int_0^{\pi/2} \frac{1}{r^2 (\ln r)^2} \cdot r d\varphi dr = \frac{\pi}{2} \int_e^R \frac{1}{r} (\ln r)^{-2} dr = \frac{\pi}{2} \frac{-1}{\ln r} \Big|_e^R = \frac{\pi}{2} \left(\frac{-1}{\ln R} + 1 \right)$$

$$I = \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{\pi}{2} \left(1 - \frac{1}{\ln R} \right) = \frac{\pi}{2}$$

3.6.5.

Improprius integrál, polártranszformációval oldjuk meg.

$x = r \cos \varphi, \quad y = r \sin \varphi, \quad |J| = r, \quad \varrho \leq r \leq \frac{1}{e}, \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$

$I = \lim_{\varrho \rightarrow +0} I_\varrho$

$$I_\varrho = \int_\varrho^{1/e} \int_0^{\pi/2} \frac{1}{r^2 \ln^3 r} \cdot r d\varphi dr = \frac{\pi}{2} \int_\varrho^{1/e} \frac{1}{r} (\ln r)^{-3} dr = \frac{\pi}{2} \frac{(\ln r)^{-2}}{-2} \Big|_\varrho^{1/e} =$$

$$= -\frac{\pi}{4} \left(\frac{1}{(\ln \frac{1}{e})^2} - \frac{1}{(\ln \varrho)^2} \right) = -\frac{\pi}{4} \left(1 - \frac{1}{(\ln \varrho)^2} \right)$$

$$I = \lim_{\varrho \rightarrow +0} -\frac{\pi}{4} \left(1 - \frac{1}{(\ln \varrho)^2} \right) = -\frac{\pi}{4}$$

3.6.6.

$$\frac{128}{9}$$

3.7.

3.7.2.

a) ...

b) ...

c) $x = r \cos \varphi, \quad y = r \sin \varphi, \quad z = z, \quad |J| = r$
 $0 \leq z \leq 16 - r^2, \quad 0 \leq \varphi \leq \pi, \quad 0 \leq r \leq 2$

$$\begin{aligned} I &= \int_0^2 \int_0^\pi \int_0^{16-r^2} z^2 \cdot r \, dz \, d\varphi \, dr = \int_0^2 \int_0^\pi r \frac{z^3}{3} \Big|_{z=0}^{16-r^2} d\varphi \, dr = \frac{1}{3} \int_0^2 \int_0^\pi r (16 - r^2)^3 d\varphi \, dr = \\ &= \frac{1}{3} \pi \frac{-1}{2} \int_0^2 -2r(16 - r^2)^3 dr = -\frac{\pi}{6} \frac{(16 - r^2)^4}{4} \Big|_0^2 = -\frac{\pi}{24} (12^4 - 16^4) \end{aligned}$$

3.7.4.

Hengerkoordinátás transzformációval:

$x = r \cos \varphi, \quad y = r \sin \varphi, \quad z = z, \quad |J| = r$
 $0 \leq \varphi \leq 2\pi, \quad 1 \leq r \leq 2, \quad 0 \leq z \leq 9 - r^2$

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \int_1^2 \int_0^{9-r^2} r^2 \cos^2 \varphi \cdot r \, dz \, dr \, d\varphi &= \int_0^{2\pi} \int_1^2 \cos^2 \varphi \cdot \underbrace{r^3 z \Big|_0^{9-r^2}}_{r^3(9-r^2)} dr \, d\varphi = \\ &= \int_0^{2\pi} \cos^2 \varphi \left(9 \cdot \frac{r^4}{4} - \frac{r^6}{6} \right) \Big|_{r=1}^2 d\varphi = \left(9 \cdot \frac{2^4}{4} - \frac{2^6}{6} - \frac{9}{4} + \frac{1}{6} \right) \int_0^{2\pi} \frac{1 + \cos 2\varphi}{2} d\varphi = \\ &= \left(36 - \frac{32}{3} - \frac{9}{4} + \frac{1}{6} \right) \cdot \frac{1}{2} \cdot 2\pi = \frac{279}{12} \pi \\ &\quad \left(\int_0^{2\pi} \cos 2\varphi \, d\varphi = 0 \right) \end{aligned}$$

3.7.5.

$$\sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 12 - (x^2 + y^2)$$

A két felület metszészvonala a $\sqrt{x^2 + y^2} = 12 - (x^2 + y^2)$ egyenletből: $\sqrt{x^2 + y^2} = 3$, tehát az $x^2 + y^2 = 3^2$ kör (a $z = 3$ síkban).

Hengerkoordinátás transzformációval:

$$\begin{aligned}x &= r \cos \varphi, & y &= r \sin \varphi, & z &= z, & |J| &= r \\r \leq z \leq 12 - r^2, & & 0 \leq r \leq 3, & & 0 \leq \varphi \leq 2\pi\end{aligned}$$

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^3 \int_r^{12-r^2} r \, dz \, dr \, d\varphi = \int_0^{2\pi} \int_0^3 \underbrace{r z \Big|_{z=r}^{12-r^2}}_{12r-r^3-r^2} \, dr \, d\varphi =$$

$$= \int_0^{2\pi} \left(6r^2 - \frac{r^4}{4} - \frac{r^3}{3} \right) \Big|_0^3 \, d\varphi = 2\pi \left(6 \cdot 3^2 - \frac{3^4}{4} - \frac{3^3}{3} \right) = 2\pi \left(45 - \frac{3^4}{4} \right)$$