

**Keresztfélév - 3. vizsga**

A vizsga időtartama 100 perc. Számológépet lehet használni. Amennyiben egy feladat máshogy nem rendelkezik, a számszerű végeredményeket 4 tizedesjegyre kerekítsük, vagy normál tört alakban adjuk meg. Minden feladat 10 pontot ér. A teljes pontszám eléréséhez a megoldás menete is szükséges, beleértve az egyes lépéseknél felhasznált tulajdonságok és tételek jelzését. A vizsga első 30 percében nem lehet a termet elhagyni.

1. a) Egy valószínűségi változót egyszerűnek nevezünk, ha véges az értékkészlete. Hogyan definiáljuk egy egyszerű valószínűségi változó várható értékét?  
 b) Mit értünk az alatt, hogy egy valószínűségi változó örökifjú a  $[0; \infty)$  intervallumon? Milyen eloszlású valószínűségi változók teljesítik a fenti tulajdonságot?
2. Béla minden héten próbára teszi a szerencséjét, és vásárol 3 darab sorsjegyet. Mindig két különböző típusú sorsjegy közül választ, de mindig csak egy típusból vásárol 3 darabot. Az  $A$  típusú sorsjegyek esetén átlagosan minden 12-edik nyer, míg egy  $B$  típusú sorsjegynél 10% a nyeresé esélye. Hogy egy adott héten melyik sorsjegyből vesz 3 darabot, azt is a szerencsére bízta: minden alkalommal feldob egy pénzérmét, és ha fejet dob, akkor az  $A$  típust választja, különben pedig a  $B$  típust. Mi a valószínűsége, hogy Béla egy adott héten legalább egy sorsjeggyel nyer? Feltéve, hogy Béla egy adott héten nyert, mi a valószínűsége, hogy az  $A$  típusból vásárolt?
3. Választunk egy számot véletlenszerűen a  $[-1; 1]$  intervallumon, majd tőle függetlenül még egyet a  $[-2; 3]$  intervallumon. Mi a valószínűsége, hogy a két szám előjele megegyezik?
4. Legyenek  $X \sim N(1; 4)$  és  $Y \sim N(-1; 9)$  független, normális eloszlású valószínűségi változók. Számítsuk ki a  $\mathbb{P}(X > 2)$  és az  $\mathbb{E}((X + Y)^2)$  értékeket.
5. Az  $X$  és  $Y$  valószínűségi változók együttes eloszlását tartalmazza az alábbi táblázat. Határozzuk meg  $Y$ -nak az  $X$ -re vett lineáris regresszióját.

	$X$		
$Y$		0	1
0		1/20	1/2
2		1/5	1/4

6. Egy jeladó tesztelése során megpróbálják annak koordinátáit különböző helyeken bemérni. Tegyük fel, hogy a mérési hiba, azaz a mért és a tényleges helyzet (méterben mért) távolsága normális eloszlást követ, melynek szórása ismeretlen. Szerkesszünk 95%-os megbízhatósági szintű konfidenciaintervallumot a hiba várható értékére, ha a tesztelés során elvégzett 10 mérésnél keletkező hibák rendre

10,2 m; 7,5 m; 9,0 m; 4,1 m; 3,7 m; 6,6 m; 6,4 m; 1,7 m; 10,8 m; 5,0 m.

Eloszlás neve	Jelölés	ran $X$	$\mathbb{P}(X = k)$ v. $F_X(t)$	$f_X(t)$	$\mathbb{E}(X)$	$\mathbb{D}^2(X)$
indikátor	$\mathbf{1}(p)$	$\{0, 1\}$	$1 - p, p$	-	$p$	$p(1 - p)$
binomiális	$B(n; p)$	$\{0, 1, \dots, n\}$	$\binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$	-	$np$	$np(1 - p)$
geometriai	$Geo(p)$	$\mathbb{N}^+$	$(1 - p)^{k-1} p$	-	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
egyenletes	$U(a; b)$	$(a; b)$	$\frac{t-a}{b-a}$ (ha $t \in (a; b)$ )	$\frac{1}{b-a}$ (ha $t \in (a; b)$ )	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
exponenciális	$Exp(\lambda)$	$[0; \infty)$	$1 - e^{-\lambda t}$ (ha $t \in (0; \infty)$ )	$\lambda e^{-\lambda t}$ (ha $t \in (0; \infty)$ )	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
normális	$N(\mu; \sigma^2)$	$\mathbb{R}$	$\Phi\left(\frac{t-\mu}{\sigma}\right)$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	$\mu$	$\sigma^2$

